

**ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ**

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА

Листовка - Приложение 2

Магнезиев Диаспорал 300 гранули за перорален разтвор

20120006

Magnesium Diasporal 300 granules for oral solution

18017 / 22.05.2012

Магнезиев цитрат (*Magnesium citrate*)

Добро обрщение №

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.
- Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

**В тази листовка:**

1. Какво представлява Магнезиев Диаспорал 300 и за какво се използва
2. Преди да приемете Магнезиев Диаспорал 300
3. Как да приемате Магнезиев Диаспорал 300
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Магнезиев Диаспорал 300
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

**1. Какво представлява Магнезиев Диаспорал 300 и за какво се използва**

Магнезиев Диаспорал 300 е минерална добавка на магнезий. Използва се при дефицит на магнезий, ако той предизвиква нарушения в мускулната активност (невромускулни разстройства, схващане на прасците).

**2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Магнезиев Диаспорал 300**

**Не приемайте Магнезиев Диаспорал 300**

- ако сте алергични (свърхчувствителни) към магнезиев цитрат или към някоя от останалите съставки на Магнезиев Диаспорал 300;
- в случай на наличие на тежки бъбречни нарушения.

**Предупреждения и предпазни мерки**

Говорете с Вашия лекар или, фармацевт преди да приемете Магнезиев Диаспорал 300.

**Прием на други лекарства и Магнезиев Диаспорал 300**

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства.

Аминогликозидни антибиотици, цисплатина и циклоспорин А ускоряват отделянето на магнезий. Магнезий, желязо, флуориди и тетрациклин си влияят взаимно на абсорбцията. Затова трябва да има интервал от 2 до 3 часа между приемането на Магнезиев Диаспорал 300 и препарати, съдържащи изброените вещества.

**Бременност, кърмене и фертилитет**



Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Магнезиев Диаспорал 300 може да се използва по време на бременност и в периода на кърмене без никакви притеснения.

### **Шофиране и работа с машини**

Магнезиев Диаспорал 300 не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

### **3. Как да приемате Магнезиев Диаспорал 300**

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Препоръчителната доза е едно саше на ден.

#### **Ако сте приели повече от необходимата доза Магнезиев Диаспорал 300**

Ако приемете повече от необходимата доза, в случай на нормална бъбречна функция, не може да се очаква интоксикация от магнезий.

#### **Ако сте пропуснали да приемете Магнезиев Диаспорал 300**

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

#### **Ако сте спрели приема на Магнезиев Диаспорал 300**

Никакви последствия не се очакват.

### **4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, Магнезиев Диаспорал 300 може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

В редки случаи ( $\geq 1/10\ 000$  до  $< 1/1\ 000$ ) лечението с Магнезиев Диаспорал 300 може да доведе до диария. За да се предотврати това, приемайте гранулите на малки порции при хранене или Магнезиев Диаспорал 100 таблетки за смучене.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

За да се избегнат нежеланите лекарствени реакции, терапията може да бъде временно прекъсната и да бъде продължена с намалена дозировка, след подобрене и/или изчезване на симптомите.

### **5. Как да съхранявате Магнезиев Диаспорал 300**

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

### **6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация**



### **Какво съдържа Магнезиев Диаспорал 300**

Активното вещество е: магнезиев цитрат.

Едно саше (5 g) съдържа: магнезиев цитрат 1830 mg (16.2% Mg).

Съдържание на магнезий: 295.7 mg = 12 ммол = 24 mEq.

Другите съставки са: захароза, безводна лимонена киселина, натриев бикарбонат, рибофлавин (E 101), овкусител (портокал).

### **Как изглежда Магнезиев Диаспорал 300 и какво съдържа опаковката**

Магнезиев Диаспорал 300 представлява жълти гранули за перорален разтвор. Предлага се в сашета от 5 g; по 20 сашета в картонена кутия.

### **Притежател на разрешението за употреба и производител**

Protina Pharmazeutische Gesellschaft mbH  
Adalperostrasse 37, 85737 Ismaning  
Германия

Дата на последно одобрение на листовката 03/2012 г.

