

## Листовка: информация за потребителя

Репарил - гел Н, гел  
1g есцин, 5g диетиламин салицилат  
Reparil® - Gel N, gel  
1g Aescin, 5g diethylamine salicylate

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашият фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани, уведомете Вашият лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

### Какво съдържа тази листовката:

1. Какво представлява Репарил - гел Н и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Репарил - гел Н
3. Как да използвате Репарил - гел Н
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Репарил гел Н
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

<b>ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА</b>	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	9700249
Разрешение №	BG/MK/MP-73989
Одобрение №	...../.....1.8..-12..-2018..

**1. Какво представлява Репарил - гел Н и за какво се използва**  
Репарил гел Н намалява отоците, спира възпалението и премахва болката

### Показания:

Травми с контузии, навяхвания, натъртвания, хематоми (кръвонасядания), възпаления на сухожилията.

Болков синдром на гръбначния стълб (прешлените, врата, лумбаго, ишиас).

Повърхностни флебити, разширени вени.

След венозни инжекции или инфузии.

**2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Репарил - гел Н**

Репарил - гел Н не трябва да се прилага върху открити рани, лигавици или кожни участъци, подложени на радиотерапия (облъчване).

**Няма специални противопоказания и специални предупреждения за употреба**

### Други лекарства и Репарил - гел Н

Не са известни взаимодействия. Моля, информирайте Вашият лекар или фармацевт ако вземате или сте вземали наскоро някакви други лекарства, даже и такива, които са без рецепта.

### Бременност, кърмене и фертилитет

По време на бременност и кърмене продължителна употреба върху обширни участъци от кожата трябва да се избягва. При кърмене продуктът не трябва да се прилага в областта на гърдите. Съветвайте се с Вашият лекар или фармацевт преди употребата на каквото и да е лекарство.



**Шофиране и работа с машини**  
Не се изискват специални мерки

### 3. Как да използвате Репарил - гел Н

Винаги прилагайте Репарил – гел Н според указанията в тази листовка. Ако сте несигурни, моля, консултирайте се с лекар или фармацевт.

*Обичайната дозировка е:*

Ако не е предписано друго от Вашия лекар, прилагайте Репарил – гел Н от един до три пъти дневно.

*Начин на употреба:*

Намазва се слой от гела върху болния участък. Не е нужно да се втрива, но при желание се допуска.

Ако имате допълнителни въпроси за употребата на този продукт, говорете с Вашия лекар или фармацевт.

### 4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Използват се следните данни за определяне честотата на тези реакции:

Много чести	повече от 1 на 10 от третираните пациенти
Чести	1 до 10 от 100 третираните пациенти
Нечести	1 до 10 от 1,000 третираните пациенти
Редки	1 до 10 от 10,000 третираните пациенти
Много редки	По-малко от 1 от 10,000 третираните пациенти
Няма известни	Честотата не може да бъде преценена от наличните данни

В много редки случаи могат да настъпят алергични кожни реакции.

Ако някоя от споменатите реакции стане сериозна или ако забележите някои неспоменати в тази листовка нежелани реакции, моля информирайте вашия лекар или фармацевт.

Ако имате допълнителни въпроси по отношение на употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

### Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата  
ул. „Дамян Груев“ № 8  
1303 София  
Тел.: +359 2 8903417  
уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

### 5. Как да съхранявате Репарил - гел Н

Да се пази на място, недостъпно за деца.

Да не се използва след изтичане срока на годност, отпечатан на кутиятата и тубата.

### Условия на съхранение

Не се изискват специални условия на съхранение.



## 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

### Какво съдържа Репарил – гел Н:

Активните вещества са:есцин (aescin) и диетиламин салицилат (diethylamine salicylate)  
100 g Репарил – гел Н, гел съдържат 1 g Есцин и 5 g Диетиламин салицилат

*Другите съставки са:* полиакрилова киселина, макрогол-6-глицерол каприлокапрат, натриев едетат, трометамол, 2-пропанол и ароматизатори

### Как изглежда Репарил – гел Н и какво съдържа опаковката

Репарил – гел Н е прозрачен, безцветен до жълтеникав

Оригиналните опаковки са по 40 g и 100 g

Не всички видове са на пазара

### Притежател на разрешението за употреба:

Майлан ЕООД

Офис сграда „Сердика офиси“

бул. Ситняково № 48, ет. 7

1505 София

България

### Производител на лекарствения продукт:

Madaus GmbH

51101 Cologne

Германия

Дата на последно преразглеждане на листовката: Ноември 2018 год.

Reg. № 9700249

### Свойства

Репарил -гел Н е специално разработен продукт на алкохолна основа, който въздейства в три направления: намалява отоците, възпрепятства възпаленията и намалява болката. Предлаган във форма, която осигурява проникването на есцина в кожата, където възпрепятства събирането на течности в тъканите и появата на отоци. Локалните отоци, предизвикващи често чувство за тежест и болезнено напрежение, бързо се отстраняват. Възпалителните процеси ефективно се овладяват. Диетиламиносалицилатът усилва противовъзпалителния ефект и има изразено болкоуспокояващо действие в дълбочина.

Репарил - гел Н притежава следните допълнителни преимущества:

- Репарил - гел Н е прозрачен и прониква бързо и напълно в болните участъци;
- Репарил - гел Н не омазнява, не зацапва и поради това е изключително чист и приятен за употреба;
- Репарил - гел Н охлажда болезнения участък, успокоява и предпазва кожата и се понася забележително добре дори и от чувствителна кожа.

