

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

96 00039

BG/MK/MP-49317

22-01-2019

СТОДАЛ, сироп
STODAL, syrup

Хомеопатичен лекарствен продукт

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява СТОДАЛ, сироп, и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете СТОДАЛ, сироп
3. Как да приемате СТОДАЛ, сироп
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате СТОДАЛ, сироп
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява СТОДАЛ, сироп, и за какво се използва

СТОДАЛ сироп е хомеопатичен лекарствен продукт, използван за симптоматично лечение на кашлица от различен произход.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете СТОДАЛ, сироп

Не приемайте СТОДАЛ, сироп

Ако сте алергични (свръхчувствителни) към активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да приемете този лекарствен продукт.

Съдържа 11 g захароза на 15 ml и 3,7 g на 5 ml. Това трябва да се има предвид при пациентите със захарен диабет.

Това лекарство съдържа малки количества етанол (алкохол), по-малко от 100 mg на 5 ml.



Този лекарствен продукт съдържа 1,7 об. % етанол (алкохол), т.е до 198 mg на 15 ml, еквивалентни на 5 ml бира или 2,1 ml вино на 15 ml.

Вреден за хора, страдащи от алкохолизъм.

Да се има предвид при бременни и кърмачки, деца и високо рискови групи като пациенти страдащи от чернодробни заболявания или епилепсия.

Това лекарство съдържа 5,4 mg бензоена киселина във всяка доза от 5 ml и 16 mg на всяка доза от 15 ml.

Деца

Бензоената киселина може да засили симптомите на жълтеница (пожълтяване на кожата и очите) при новородени (на възраст до 4 седмици).

Други лекарства и СТОДАЛ, сироп

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Прием на СТОДАЛ, сироп, с храни и напитки

Този лекарствен продукт трябва да се приема между храненията.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Няма наблюдавано въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.

СТОДАЛ, сироп съдържа етанол, захароза и бензоена киселина.

3. Как да приемате СТОДАЛ, сироп

Перорално приложение.

Възрастни: една доза от 15 ml от сиропа, измерена с мерителната чашка, 3 до 5 пъти дневно.

Деца: една доза от 5 ml от сиропа, измерена с мерителната чашка, 3 до 5 пъти дневно.

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приели повече от необходимата доза СТОДАЛ, сироп

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете СТОДАЛ, сироп

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на лекарство, моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт.



4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Не се очакват нежелани лекарствени реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно на

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +35928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате стодал, сироп

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство, след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

СТОДАЛ, сироп, може да се използва до 12 месеца след датата на първоначалното отваряне на бутилката.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа СТОДАЛ, сироп

Състав за 100 g

- Активните вещества са :

Anemone pulsatilla 6 CH.....	0.95 g
Rumex crispus 6 CH.....	0.95 g
Bryonia 3 CH.....	0.95 g
Ipecacuanha 3 CH.....	0.95 g
Spongia tosta 3 CH.....	0.95 g
Sticta pulmonaria 3 CH.....	0.95 g
Antimonium tartaricum 6 CH.....	0.95 g
Myocarde 6 CH.....	0.95 g
Coccus cacti 3 CH.....	0.95 g
Drosera TM.....	0.95 g

- Помощни вещества: сироп от толутанов балсам, сироп от полигала, захарен сироп, карамел, бензоена киселина, етанол 96 об. %.



Как изглежда СТОДАЛ, сироп, и какво съдържа опаковката

Сироп в бутилка от 200 ml и мерителна чашка.

Сироп в бутилка от 200 ml с приспособление за отливане и мерителна чашка.

Притежател на разрешението за употреба и производител:

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Франция

Дата на последно преразглеждане на листовката 12/2018

