

9500006

**Листовка: информация за потребителя**

B6/M/Mb-96969

Стрепсилс Мед и Лимон 1,2 mg /0,6 mg таблетки за смучене  
2,4-Дихлоробензилов алкохол/ Амилметакрезол

01-08-2019

Strepsils® Honey and Lemon 1,2 mg /0,6 mg lozenges  
2,4-Dichlorobenzyl alcohol Amylmetacresol

**Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошат или не се подобряват повече от 5 дни.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

**Какво съдържа тази листовка:**

1. Какво представлява Стрепсилс Мед и Лимон и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да приемете Стрепсилс Мед и Лимон
3. Как да приемете Стрепсилс Мед и Лимон
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Стрепсилс Мед и Лимон
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

**1. Какво представлява Стрепсилс Мед и Лимон и за какво се използва**

Стрепсилс Мед и Лимон принадлежи към група лекарствени продукти наричани антисептици.

Стрепсилс Мед и Лимон се препоръчва за лечение и облекчаване на симптомите при инфекциозно-възпалителни заболявания на устната кухина (стоматити, фарингити, ларингити).

**Притежава антибактериални, противогъбични и антивирусни свойства.**

**Ефектът се проявява в първите 5 минути и продължава до 2 часа след приложението на лекарствения продукт.**

**2. Какво трябва да знаете преди да приемете Стрепсилс Мед и Лимон**

**Не приемайте Стрепсилс Мед и Лимон**

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към 2,4-Дихлоробензилов алкохол, Амилметакрезол или към някоя от останалите съставки на Стрепсилс Мед и Лимон, посочени в т.6
- от деца под 6 годишна възраст

**Предупреждения и предпазни мерки**

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Стрепсилс Мед и Лимон.

**Обърнете специално внимание при употреба на Стрепсилс Мед и Лимон**

- ако имате захарен диабет – виж раздел **Важна информация за някои от съставките на Стрепсилс Мед и Лимон**



## **Деца**

Този лекарствен продукт е противопоказан при деца под 6 годишна възраст.

## **Други лекарства и Стрепсилс Мед и Лимон**

Информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Не са известни взаимодействия с други лекарствени продукти.

## **Приложение на Стрепсилс Мед и Лимон с храни и напитки**

Стрепсилс Мед и Лимон не трябва да се прилага с храни и напитки. Да се прилага между храненията.

## **Бременност, фертилитет и кърмене**

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

### Бременност

Макар че безопасността на продукта по време на бременност не е била установена, лекарственият продукт може да се приема с внимание от бременни жени. При необходимост да се потърси лекарски съвет.

### Кърмене

Не е известно дали 2,4-Дихлоробензилов алкохол, Амилметакрезол или техните метаболити се екскретират в майчиното мляко. Безопасността на това лекарство по време на кърмене не е установена. Не може да се изключи риска за новородените/бебетата. Този лекарствен продукт трябва да се прилага с внимание при кърмещи жени.

### Фертилитет

Няма налични данни за ефекта върху фертилитета.

## **Шофиране и работа с машини**

Стрепсилс Мед и Лимон не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

## **Важна информация за някои от съставките на Стрепсилс Мед и Лимон**

Стрепсилс Мед и Лимон съдържа глюкоза и захароза. Ако Вашият лекар Ви е предупредил, че имате непоносимост към някои видове захари, моля обърнете се към него за съвет преди да използвате това лекарство.

Всяка таблетка Стрепсилс Мед и Лимон съдържат: 1 g глюкоза и 1,4 g захароза. Това трябва да се има предвид при пациенти със захарен диабет.

## **3. Как да приемете Стрепсилс Мед и Лимон**

Винаги приемайте Стрепсилс Мед и Лимон точно както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Да се използва най-ниската ефективна доза за най-кратък период от време необходим за облекчаване на симптомите.

### **Възрастни и деца над 6 години**

Една таблетка се смуче бавно през 2 – 3 часа; таблетките за смучене се оставят в устата докато се разтворят; да не се дъвчат или поглъщат цели; приемат се между храненията. **Като при други подобни лекарствени продукти, Вие трябва да смените позицията на таблетките за смучене във вътрешността на устата до тяхното разтваряне, за да се избегне риска от локално дразнене.**



### **Употреба при деца**

Деца под 6 годишна възраст не трябва да използват този продукт.

За да се избегне риска от задавяне, Стрепсилс Мед и Лимон се прилага само при деца, които могат без надзор да задържат таблетката за смучене в устата докато тя се разтваря бавно.

### **Пациенти в старческа възраст**

При пациенти в старческа възраст не е необходимо да се намалява дозата.

Лечението не трябва да продължава повече от 5 дни, тъй като може да доведе до дисбаланс на устната микробна флора и риск от бактериална или гъбична инфекция.

### **Ако сте приели повече от необходимата доза Стрепсилс Мед и Лимон**

Може да се появи стомашно-чревен дискомфорт; употребата трябва да се прекрати и да се започне симптоматично лечение – за тази цел трябва да се консултирате с Вашия лекар или център за спешна помощ.

### **Ако сте пропуснали да приемете Стрепсилс Мед и Лимон**

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка за смучене.

### **Ако спрете да приемете Стрепсилс Мед и Лимон**

Преждевременното прекратяване на лечението няма да Ви повлияе.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

## **4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, Стрепсилс Мед и Лимон може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

За честотата на страничните ефекти се съди по следните категории:

Много чести:	Повече от 1 на 10 пациенти
Чести:	1 до 10 на 100 от пациентите
Нечести:	1 до 10 на 1 000 от пациентите
Редки:	1 до 10 на 10 000 от пациентите
Много редки:	По-малко от 1 на 10 000 пациентите
С неизвестна честота:	От наличните данни не може да бъде направена оценка.

### **С неизвестна честота**

Реакции на свръхчувствителност, болки в корема, диария, гадене, дискомфорт в устната кухина и обрив.

Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

### **Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване,

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София



1303 София  
Тел.: +359 2 8903417  
уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

## 5. Как да съхранявате Стрепсилс Мед и Лимон

Не използвайте Стрепсилс Мед и Лимон след срока на годност отбелязан на картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.  
Да се съхраняват под 25°C.  
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнери за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще помагат за опазване на околната среда.

## 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

### Какво съдържа Стрепсилс Мед и Лимон

Активните вещества са: 2,4-Дихлоробензилов алкохол 1,2 mg и Амилметакрезол 0,6 mg.  
Другите съставки са: мед, винена киселина, ментово масло, лимоново масло, течна захароза, течна глюкоза, оцветител E104.

### Как изглежда Стрепсилс Мед и Лимон и какво съдържа опаковката

Жълто оцветена овална таблетка за смучене, с характерен вкус на мед и лимон и отпечатано лого S от двете страни.

Опаковките Стрепсилс Мед и Лимон съдържат 12, 24 и 36 таблетки за смучене в блистери от твърдо алуминево фолио PVC/PVDC и картонена кутия.

### Притежател на разрешението за употреба:

Reckitt Benckiser (Romania) S.R.L.  
89-97 Grigore Alexandrescu Str., Building A, 5th floor, district 1  
Bucharest, Румъния

### Производители:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.  
Nottingham Site, Thane Road, Nottingham, NG90 2DB  
Обединено Кралство

RB NL Brands B.V.  
Schiphol Boulevard 207  
1118 BH Schiphol,  
Нидерландия

Моля свържете се с местния представител на притежателя на разрешението за употреба, за да получите допълнителна информация за лекарствения продукт.

Дата на последно преразглеждане на листовката: март, 2019

