

## Листовка: Информация за потребителя

Traumeel S, tablets  
Траумил S, таблетки

Хомеопатичен лекарствен продукт

<b>ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА</b>
Листовка - Приложение 2
Към Рег. № ..... 26200090
Разрешение № 4-16556 / 26.01.2012
Одобрение № .....

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

### В тази листовка:

1. Какво представлява Траумил S и за какво се използва
2. Преди да приемете Траумил S
3. Как да приемете Траумил S
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Траумил S
6. Допълнителна информация

### 1. Какво представлява Траумил S и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт.

Наранявания, като навяхвания, изкълчвания, натъртвания, кръвоизливи и изливи в ставите след счупвания на костите; постоперативни и посттравматични отоци и подувания на меките тъкани. Възпалителни и свързани с възпаления дегенеративни процеси на различни органи и тъкани особено на опорно-двигателния апарат /тендовагинит, стилоидит, епикондилит, бурсит, хумероскапуларен периартрит/, артроза на тазобедрените, коленните и малките стави.

### 2. Преди да приемете Траумил S

- Не приемайте Траумил S, ако имате свръхчувствителност към някоя от основните или помощни съставки на продукта или свръхчувствителност към арника, лайка, бял равнец или друго растение от сем. Сложноцветни. По принцип ехинацея не трябва да се приема при прогресиращи системни заболявания като туберкулоза, левкемия или левкемио-подобни заболявания, колагенноза, авто-имунни заболявания, мултипла склероза, ХИВ инфекции, СПИН и други хронични вирусни заболявания.

Този лекарствен продукт съдържа лактоза. Ако имате непоносимост към някои захари се консултирайте с лекар, преди приемането на този лекарствен продукт. Ако симптомите продължат или се влошат се консултирайте с лекар или фармацевт.

- Употреба на други лекарства – не са известни лекарствени взаимодействия
- Употреба на Траумил S с храни и напитки – няма несъвместимости
- Бременност и кърмене – посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.



- Шофиране и работа с машини – Траумил S не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

### 3. Как да приемете Траумил S

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

При възрастни и деца над 3 год. възраст обикновено 3 пъти по 1 таблетка дневно.

Таблетките не се гълтат, а се държат в устата до разтварянето им.

Поглъщането на таблетката не води до никакви вредни последствия!

- Употреба при деца – При кърмачета и деца до 3 год. възраст – по ½ таблетка до 3 пъти дневно. Таблетката се стрива и се нанася от вътрешната страна на бузата.

- Ако сте приели повече от обичайната доза – Траумил S няма доза на предозиране

- Ако сте пропуснали да приемете Траумил S – Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.

- Ако сте спрели употребата на Траумил S – Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

- Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар

### 4. Възможни нежелани реакции

В много реки случаи може да се появи реакция на свръхчувствителност или алергична кожна реакция (зачервяване, оток и сърбеж) при пациенти, свръхчувствителни към растения от сем. Сложноцветни, т.е. арника, лайка, бял равнец и в такъв случай приемането на продукта да се спре. Кожен обрив и сърбеж, и в много редки случаи подуване на лицето, задух, замайване и понижаване на кръвното налягане са наблюдавани след лечение с продукти, съдържащи екстракти от ехинацея.

### 5. Как да съхранявате Траумил S

Без специални условия на съхранение.

Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !

Срок на годност – 5 години.

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

### 6. Допълнителна информация

- Какво съдържа Траумил S

1 таблетка съдържа:

Активни вещества:

Achillea millefolium	D3	15 mg
Aconitum napellus	D3	30 mg
Arnica montana	D2	15 mg
Atropa bella-donna	D4	75 mg
Bellis perennis	D2	6 mg
Calendula officinalis	D2	15 mg



Echinacea	D2	6 mg
Echinacea purpurea	D2	6 mg
Hamamelis virginiana	D2	15 mg
Hepar sulfuris	D8	30 mg
Hypericum perforatum	D2	3 mg
Matricaria recutita	D3	24 mg
Mercurius solubilis Hahnemanni	D8	30 mg
Symphytum officinale	D8	24 mg

Помощни вещества:

Лактоза

Магнезиев стеарат

- Как изглежда и какво съдържа опаковката: Пластмасов контейнер, съдържащ 50 таблетки/ картонена кутия

- Притежател на разрешението за употреба и производител:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

D-76532 Baden-Baden, Германия

- Дата на последно одобрение на листовката:

05.2011

