

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Веносмил 200 mg твърди капсули

Venosmil 200 mg capsules, hard

Хидросмин / Hidrosmin

Листовка - Приложение 2

Към Рег. №

2015/0110

Разрешение №

Одобрение №

44594

14-10-2019

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте т. 4.
- Ако не се чувствате по-добре след 2 седмици или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Веносмил и за какво се използва;
2. Какво трябва да знаете преди да приемете Веносмил капсули;
3. Как да приемате Веносмил капсули;
4. Възможни нежелани реакции;
5. Как да съхранявате Веносмил;
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация.

1. Какво представляват Веносмил капсули и за какво се използва

Веносмил е медикамент от групата на венотониците, който увеличава венозния тонус и резистентност на капилярите (Малките кръвоносни съдове).

Веносмил се използва при възрастни за облекчаване на симптомите, свързани с лека хронична венозна недостатъчност на долните крайници като болка, тежест, стягане, изтръпване, парене в краката с разширени вени и отоци на краката. Ако симптомите не се подобрят след две седмици, клиничната ситуация трябва да се преоцени.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Веносмил капсули.

Не приемайте Веносмил

- ако сте алергични (Хиперсензитивни) към хидросмин или някоя от другите съставки на този лекарствен продукт (изброени в т.6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Веносмил капсули.

Не приемайте за продължителен период от време без медицинско наблюдение.



Деца и юноши

Не се препоръчва употребата му при деца и юноши, освен ако не е предписан от Вашия лекар.

Прием на други лекарства и Веносмил капсули

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или се нуждаете от прием на други лекарства. Включително и такива, отпускани без лекарско предписание.

Не са наблюдавани несъвместимости с други лекарства. Въпреки това никога не взимайте решение да приемате, освен ако не са препоръчани от Вашия лекар.

Веносмил с храна и напитки

Засега не са известни никакви взаимодействия с храни.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или сте в период на кърмене, смятате, че може да сте или планирате да забременеете, моля, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате това лекарство.

Няма клинични данни за Веносмил по отношение на употребата на хидросмин при бременни жени. Като предпазна мярка, употребата на Веносмил не се препоръчва по време на бременност, освен ако по мнението на Вашия лекар, потенциалните ползи от приложението му не превишават възможните рискове.

Няма клинични данни за употребата на хидросмин при кърмещи жени. Не е известно дали хидросмин се екскретира в кърмата, поради което не се препоръчва употребата му по време на кърмене.

Шофиране и работа с машини

Всеки ефект върху способността Ви за шофиране или работа с машини, когато приемате ВЕНОСМИЛ е незначителен или маловажен.

3. Как да приемате Веносмил капсули

Внимателно следвайте инструкциите за приложение на това лекарство, както Ви е предписал Вашият лекар или фармацевт. Ако имате съмнения, моля консултирайте се повторно с Вашия лекар или фармацевт.

Да се приема само през устата.

Ако симптомите не се подобрят след две седмици, клиничната ситуация трябва да се преоцени. В случай на необходимост лечението може да продължи с една и съща дневна доза до 2-3 месеца.

Възрастни

Обичайната дневна доза Веносмил е една капсула от 200 mg, три пъти дневно по време на хранене.

Деца и юноши

Да не се използва от деца или юноши, освен ако не е указано от Вашия лекар.



Инструкции за правилно прилагане на лекарството

Веднъж отстранена от блистера, капсулата трябва да се вземе незабавно. За да се погълне, капсулата може да се приема с вода или друга напитка.

Ако вземете повече Веносмил, отколкото трябва

Ако вземете свръхдоза или случайно погълнете Веносмил, незабавно се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт, посетете медицински център или се свържете с клиника по токсикология, като посочите името на лекарството и погълнатото количество.

Ако забравите да вземете Веносмил

Ако сте пропуснали да приемете Вашата доза Веносмил, вземете я веднага щом се сетите. Ако е почти време да се приеме следващата доза, пропуснете пропуснатата доза и продължете със следващите капсули в нормалното време.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатите дози.

Ако не сте сигурни как да използвате това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки, че не всеки ги получава.

Докато използвате капсулите Веносмил, са наблюдавани следните нежелани реакции. Не беше възможно да се установи точната честота на тези ефекти:

- реакции на свръхчувствителност (Алергии) към основната активна съставка (хидросмин) или някое от помощните му вещества (вж. Точка 2 "Какво трябва да знам преди приема на Веносмил?")
- замаяност
- главоболие
- стомашни болки
- гадене
- обрив
- сърбеж

Съобщаване за нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани реакции, кажете на Вашия лекар или фармацевт. Това включва и такива, неописани в тази листовка. Можете също да съобщите за нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване,

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате за нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.



5. Как да съхранявате Веносмил капсули

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 30 ° С.

Не използвайте Веносмил след срока на годност, отбелязан върху опаковката след „Годен до:“. Срокът на годност е последният ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарства в контейнера за домашни отпадъци или канализацията. Моля, попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлите нежеланите опаковки и лекарства. Този метод помага за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Веносмил

- Основното активно вещество е хидросмин. Всяка капсула съдържа 200 mg хидросмин.

- Другите съставки (Ексципиенти) са магнезиев стеарат и желатиновите капсули съдържат: желатин, еритрозин (E127), хинолиново жълто (E104), титанов диоксид (E171) и пречистена вода.

Как изглежда Веносмил и какво съдържа опаковката

Веносмил е опакован в алуминиеви / PVC блистерни ленти с 20 и 60 твърди желатинови капсули с оранжево оцветяване, които съдържат фин жълт прах.

Притежател на разрешението за употреба и производител

FAES FARMA S.A.,
Maximo Aguirre 14,
48 940 Leioa (Vizcaya),
Испания

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Вивафарма Салюшънс ООД

Георги Георгиев
ж.к. Младост 1, бл.54А, ет.5
1750 София

Дата на последно преразглеждане на листовката: Април 2019

