

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	20650184
Към Рег. №	1-29611, 01-05-2015
Разрешение №	1-29611, 01-05-2015
Одобрение №	

Листовка: информация за потребителя

Проспан 26 mg таблетки за смучене

Сух екстракт от листа на бършлян

Prospan 26 mg lozenges

Hedera helix folium extractum siccum

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след седмица не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Проспан таблетки за смучене и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Проспан таблетки за смучене
3. Как да използвате Проспан таблетки за смучене
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Проспан таблетки за смучене
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Проспан таблетки за смучене и за какво се използва

Проспан таблетки за смучене е растителен лекарствен продукт, който се използва за симптоматично лечение на хронични бронхиални заболявания и остри възпаления на дихателните пътища, придружени с кашлица.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Проспан таблетки за смучене

Не използвайте Проспан таблетки за смучене

- ако сте алергични към активното вещество или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Проспан таблетки за смучене.

Ако оплакванията продължават или се появи задух, температура, както и гнойни или кървави храчки, се налага незабавна консултация с лекар.

Деца

Проспан таблетки за смучене не е предназначен за деца под 6 годишна възраст.

Други лекарства и Проспан таблетки за смучене

До момента не са провеждани проучвания за взаимодействия. До момента не са известни взаимодействия между Проспан таблетки за смучене и други лекарствени продукти.



Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Бременност, кърмене и фертилитет

Това лекарство не трябва да се използва в периода на бременност и кърмене, тъй като няма достатъчно данни от провеждани проучвания с бременни и кърмещи жени.

Шофиране и работа с машини

Не са необходими специални предпазни мерки.

Проспан таблетки за смучене съдържа сорбитол и малтитол.

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да приемете този продукт.

3. Как да използвате Проспан таблетки за смучене

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

Възрастни и деца над 12 годишна възраст смучат по 1 таблетка 4 пъти дневно (еквивалентно на 104 mg сух екстракт от листа на бършлян или 624 mg изходното вещество дневно).

Деца на възраст между 6 и 12 години смучат по 1 таблетка два пъти дневно (еквивалентно на 52 mg сух екстракт от листа на бършлян или 312 mg от изходното вещество дневно).

Начин на приложение

За перорална употреба. Таблетки за смучене

Оставете таблетките да се разтворят бавно в устата, след хранене (да не се приемат в легнало положение).

Продължителност на употребата

Продължителността на лечението зависи от вида и тежестта на симптомите.

По правило лечението трябва да продължи около 1 седмица. Ако, обаче симптомите Ви продължават повече от 1 седмица, моля потърсете съвет от лекар.

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако имате усещането, че ефектът на Проспан таблетки за смучене е твърде силен или твърде слаб.

Ако сте приели повече от необходимата доза Проспан таблетки за смучене

Не превишавайте препоръчваната дневна доза. Приемането на значително високи количества (3 пъти дневната доза) може да предизвика гадене, повъръщане и диария. В този случай е необходимо да се консултирате с Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да приемете Проспан таблетки за смучене

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата. Продължете приема на лекарството според предписанието на Вашия лекар или указанията в тази листовка.

4. Възможни нежелани реакции



Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

За оценяване на нежеланите лекарствени реакции е използвана следната класификация

Много чести	повече от 1 на 10 пациенти
Чести	от 1 до 10 на 100 пациенти
Нечести	от 1 до 10 на 1000 пациенти
Редки	от 1 до 10 на 10 000 пациенти
Много редки	по-малко от 1 на 10 000
С неизвестна честота	(от наличните данни не може да бъде направена оценка)

Много редки

Могат да възникнат алергични реакции като задух, оток, зачеряване на кожата и сърбеж след приемането на лекарства, съдържащи бършлян.

Нечести

При пациенти с повишена чувствителност могат да възникнат стомашно-чревни оплаквания като гадене, повръщане и диария.

При първите симптоми на алергия, лечението трябва да се преустанови.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите никакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно (вижте детайлите по-долу). Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Изпълнителна Агенция по Лекарствата

София 1303, ул. Дамян Груев 8

Тел.: +359-28903417

Уебсайт: www.bda.bg

5. Как да съхранявате Проспан таблетки за смучене

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява при температура под 25°C!

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелзан върху картонената опаковка и блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Проспан таблетки за смучене

- Активното вещество е: сух екстракт от листа на бършлян. 1 таблетка за смучене съдържа 26 mg сух екстракт от листа на бършлян (*Hedera helix folium extractum siccum*) (5-7.5) : 1). Разтворител, използван за екстракцията: етанол 30% об./об.
- Другите съставки са: Течен малтитол, течен сорбитол 70% (некристализирана), акация, лимонена киселина, калиев ацесулфам, средноверижни триглицериди, аромат на портокал, ментолов аромат, пречистена вода.



1 таблетка за смучене съдържа 0,53 g малтитол и 0,53 g сорбитол, еквивалентен на приблизително 0,09 хлебни единици.

1 таблетка за смучене съдържа 2,6 kcal=10,6 kJ

Как изглежда Проспан таблетки за смучене и какво съдържа опаковката

Проспан таблетки за смучене се предлага в оригинална опаковка от 20 таблетки за смучене.

Притежател на разрешението за употреба и производител:

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG
Herzbergstrasse 3
61138 Niederhofelden
Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Ведра Интернейшънъл АД
София 1407
ул. Червена стена 58

Дата на последно преразглеждане на листовката - май 2015.

Забележка:

Проспан таблетки за смучене съдържа растително активно вещество. Поради съдържанието на този растителен екстракт, цветът и вкусът на Проспан таблетки за смучене може леко да се променят. Това, обаче не оказва ефект върху качеството на продукта.

Растителните екстракти се приготвят от изсушени растения, или така наречената „дрога“. Изсушените листа от бързия се подлагат преди всичко на екстракция, т.е. съставките се отделят в смес, състояща се от вода и алкохол. Този процес се нарича екстракция. По време на фазата на сушене, алкохолът се отстранява напълно от сместа. Така, крайният продукт не съдържа алкохол.

Важен термин за описанието на качеството на екстракти е така нареченото съотношение дрога към екстракт. Съотношение 5-7,5:1 означава, че 1 част екстракт е извлечена от 5-7,5 части дрога.

Проспан-решение при кашлица

Проспан спомага за втечняването на гъстия секрет и по този начин улеснява отхрачването. В същото време кашлицата намалява. По този начин Проспан се бори с типичните симптоми на бронхита: свръхпродукция на гъст секрет, задух и кашлица, като по този начин позволява на пациента да дишава свободно.

Проспан таблетки за смучене не съдържа глутен.

Желаем Ви бързо възстановяване.

