

Листовка: информация за пациента

Ангал Ментол 2 mg/ml+0,5 mg/ml спрей за устна лигавица, разтвор
хлорхексидинов диглюконат/лидокаинов хидрохлорид

Angal Menthol 2 mg/ml+0,5 mg/ml oromucosal spray, solution
chlorhexidine digluconate/lidocaine hydrochloride

20160318

B6/MA/Mh-5185

27-04-2018

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3-4 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Ангал Ментол и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Ангал Ментол
3. Как да използвате Ангал Ментол
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Ангал Ментол
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Ангал Ментол и за какво се използва

Ангал Ментол е лекарство с локално действие в устната кухина и фаринкса. Има антисептичен ефект и локално обезболяващо действие.

Ангал Ментол се препоръчва при:

- Лечение на симптомите на зачервено, възпалено гърло, заболявания на фаринкса и устната кухина, съпроводени с раздразнения като възпаление на венците, устната лигавица и афти;
- В случаи на бактериална инфекция, съпроводена с висока температура е необходимо допълнително лечение;
- Ангал Ментол не съдържа захар, което го прави подходящ и за диабетици.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Ангал Ментол


Не използвайте Ангал Ментол:

- Ако сте алергични към хлорхексидинов глюконат или лидокаинов хидрохлорид, или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
- При деца под 6-годишна възраст.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате Ангал Ментол.

- Ангал Ментол не трябва да се използва за дълги периоди от време със или без прекъсвания. Употребата трябва да се ограничи до необходимото достигане на облекчаване на болката и дразненето;
- Да се избягва контакт с очите, ушите и кожата. При попадане в очите, незабавно изплакнете с обилно количество вода;
- В случай на предозиране (повече от 1 опаковка дневно) има малък риск от намаляване на контрола върху гълтателния рефлекс;
- Да се внимава при деца с анамнеза за гърчове. Това лекарството съдържа левоментол;



- Ангал Ментол съдържа алкохол и левоментол. Моля прочетете също „Ангал Ментол съдържа левоментол и алкохол“;
 - Ако приемате други лекарства, моля вижте „Други лекарства и Ангал Ментол“.
- Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако някое от изброените предупреждения се отнася или се е отнасяло до Вас макар и в миналото.

Деца

Не използвайте това лекарство при деца под 6-годишна възраст.

Други лекарства и Ангал Ментол

Информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Не използвайте едновременно с други дезинфектанти.

Ангал Ментол с храна, напитки и алкохол

Не са необходими специални предпазни мерки.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Ангал Ментол съдържа алкохол. Моля вижте: „Ангал Ментол съдържа левоментол и алкохол“.

Ако са спазени изброените предпазни мерки и предупреждения, Ангал Ментол може бъде използван при бременност и кърмене. Информирайте Вашия лекар, че приемате това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Не са необходими специални предпазни мерки.

Ангал Ментол съдържа левоментол и алкохол

Ангал Ментол съдържа левоментол: бъдете внимателни при употреба при деца с анамнеза за гърчове.

Ангал Ментол съдържа алкохол (44,4% (v/v) етанол) т.е. повече от 180 mg за 5 впръсквания, еквивалентни на 4,5 ml бира или 2 ml вино за 5 впръсквания. Това може да навреди на пациенти страдащи от алкохолизъм. Това трябва да се има предвид при бременни, кърмачки, деца и високорискови групи пациенти като такива с чернодробни заболявания или епилепсия.

3. Как да използвате Ангал Ментол

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство не трябва да се използва за дълъг период от време. Консултирайте се с Вашия лекар ако симптомите Ви не се повлияват или се влошават след 3-4 дни.

Насочете апликатора към фаринкса и натиснете спрей помпата.

Препоръчителната доза е:

Възрастни и деца над 12-годишна възраст: 3 до 5 впръсквания, 6 до 10 пъти дневно.

Деца над 6-годишна възраст: 2 до 3 впръсквания, 3 до 5 пъти дневно.

Не използвайте това лекарство при деца под 6-годишна възраст.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Ангал Ментол

При правилно използване рискът от предозирание е много малък.

Симптомите на предозирание са: умора, шум в ушите, затруднено дишане, нарушения на сърдечния ритъм, нарушен контрол на гълтателния рефлекс.

Ако сте пропуснали да използвате Ангал Ментол

Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели да използвате Ангал Ментол



Не са необходими специални мерки.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

- Много редки: алергични реакции на кожата и лигавиците;
- По изключение могат се проявят промени във вкуса, усещане за парене върху езика или тежки алергични реакции (анафилактични реакции);
- Продължителното и непрекъснато използване може да предизвика кафяво оцветяване на зъбите, като това е преходно и обратимо.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена по-долу:

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
Тел.: +359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Ангал Ментол

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се съхранява под 25°C.

Не използвайте Ангал Ментол след срока на годност, отбелязан на кутията/етикета след надписа "Годен до:". Първите два символа означават месеца, следващите два или четири символа-годината. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Ангал Ментол може да се използва до 3 месеца след първото отваряне.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Ангал Ментол

- Активните вещества са: хлорхексидинов диглюконат 2 mg/ml и лидокаинов хидрохлорид 0,5 mg/ml.
- Другите съставки са: етанол, глицерол, безводна лимонена киселина, левоментол, цинеол, захарин-натрий, пречистена вода.

Как изглежда Ангал Ментол и какво съдържа опаковката

Ангал Ментол е наличен в бутилка със спрей помпа, съдържаща 30 ml спрей за устна лигавица (абсорбция през лигавицата на устната кухина).

Притежател на разрешението за употреба и производители

Притежател на разрешението за употреба



Sandoz d.d.
Verovškova 57,
1000 Ljubljana
Словения

Производители
Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A.
Rijksweg 9, 2880 Bornem
Белгия

Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57, 1526 Ljubljana,
Словения

Дата на последно преразглеждане на листовката
ММ/ГГГГ

