

## Листовка: Информация за потребителя

### Калгел 0,1 g/0,33 g/100 g гел за венци Calgel 0,1 g/0,33 g/100 g gingival gel

Цетилпиридинов хлорид, лидокаинов хидрохлорид  
*/cetylpyridinium chloride, lidocaine hydrochloride/*

**Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват 7 дни.
- Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

#### Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Калгел и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Калгел
3. Как да използвате Калгел
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Калгел
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

#### 1. Какво представлява Калгел и за какво се използва

Калгел е гел за венци.

Калгел е подходящ за малки деца и кърмачета на възраст над 3 месеца.

Калгел се прилага при кърмачета в периода на никнене на зъбки. Калгел бързо облекчава болката, предизвикана от поникването на зъбки и успокоява венеца. Калгел притежава и слабо антисептично действие.

#### 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Калгел

Калгел не трябва да се прилага при деца, които са алергични към продукта или някоя от неговите съставки.

#### 3. Как да използвате Калгел

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Малко количество - около 7-8 mm лентичка от гела (0,22 g) се изстисква върху върха на пръста или върху памучна кърпичка и внимателно се нанася върху зачервената част на венеца.

Апликациите могат да се прилагат при нужда. Изчакайте 2 часа преди да повторите приложението на гела.

Да не се прилагат повече от 6 апликации дневно.

Калгел е подходящ за деца над тримесечна възраст.

#### 4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Калгел може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Съобщават се следните нежелани реакции: *свръхчувствителност (включително дерматит, реакции на мястото на приложение (включително еритема)).*

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Ред. № .....	20011216
Разрешение № .....	B6/178/176-52023
Одобрение № .....	/
09 -08- 2018	



## **Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата  
ул. „Дамян Груев“ № 8  
1303 София  
Тел.: +359 2 8903417  
уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

## **Предупреждения и предпазни мерки**

Препоръчаната доза не трябва да се надвишава. В случай на поява на нежелани реакции или при предозиране, преустановете приложението на гела и се консултирайте с лекар.

### **5. Как да съхранявате Калгел**

Да се съхранява при температура под 25°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да не се използва след изтичане на срока на годност, означен върху опаковката.

Не употребявайте Калгел след датата на изтичане на срока на годност, отбелязана върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

### **6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация**

#### **Какво съдържа Калгел**

Активните вещества са: лидокаинов хидрохлорид и цетилпиридинов хлорид.

Другите съставки са:

Сорбитол, ксилитол, етанол 96%, глицерол, хидроксиетилцелулоза, макроголглицерол хидроксистеарат, макроголов лаурил етер, макрогол 300, захарин натрий, левоментол, билков вкус, карамел E150, лимонена киселинаmonoхидрат, натриев цитрат, пречистена вода.

#### **Как изглежда Калгел и какво съдържа опаковката**

Алуминиева туба в картонена кутия.

Количество в една опаковка – 10 g.

#### **Притежател на разрешението за употреба и производител:**

##### **Притежател на разрешението за употреба**

McNeil Healthcare (Ireland) Ltd.

Airton Road, Tallaght

Dublin 24

Ирландия

##### **Производител**

Famar Orléans,

5, avenue de Concyr, 45 071 ORLÉANS

Cedex 2

Франция.



За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на разрешението за употреба:

Джонсън & Джонсън България ЕООД  
Бизнес Парк София, блок 4, Младост 4  
София 1766  
Тел. 02/4899 400

**Дата на последно преразглеждане на листовката: Май 2018**

