

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ДИЙП РИЛИЙФ 50 mg/g+30 mg/g гел
DEEP RELIEF 50 mg/g+30 mg/g gel

Ибупрофен / Левоментол
Ibuprofen / Levomenthol

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 14 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Дийп Рилийф гел и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Дийп Рилийф
3. Как да използвате Дийп Рилийф гел
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Дийп Рилийф гел
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20020637
Разрешение №	B6/MK/MP-40298
Одобрение №	19-04-2019

1. Какво представлява Дийп Рилийф гел и за какво се използва

Дийп Рилийф е гел за локално приложение, който успокоява болката и има противовъзпалително действие. Използва се за симптоматично облекчаване на ревматични и мускулни болки и възпаление при изкълчвания, навяхване и спортни травми.

Дийп Рилийф съдържа ибупрофен, който е от групата на нестероидните противовъзпалителни средства (NSAIDS) и осигурява ефективно и дълготрайно облекчение на болката, намалява възпалението и отока. Левоментол има охлаждащ ефект и осигурява допълнително облекчение на болката. Съставът на гела с двойно действие позволява бърза и концентрирана абсорбция на активните вещества през кожата на мястото на болката. Резултатът от комбинацията на ибупрофен и левоментол, заедно с помощното вещество диизопропаноламин е незабавно и дълготрайно облекчаване на болката.

Ако след 14 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Дийп Рилийф гел

Не използвайте Дийп Рилийф

- ако сте алергични към ибупрофен, левоментол или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6)..
- гелът е противопоказан при пациенти с астма, при които аспиринът или нестероидните противовъзпалителни средства предизвикват астматични пристъпи, ринити или уртикария.



Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате Дийп Рилийф.

- Само за външна употреба върху здрава кожа!
- Да не се нанася върху отворени рани, възпалена или наранена кожа!
- Да не се нанася в близост до очите!
- Да не се използва с оклузивни превръзки!
- Ръцете трябва да се измиват след нанасянето на продукта.
- Да се прекрати употребата на гела, ако кожата или болното място е силно раздразнено!
- При поглъщане на гела, пациентът трябва веднага да се свърже с лекар от най-близката спешна медицинска помощ!
- Не излагайте на слънчева светлина третираната област веднага след нанасяне на гела.

Деца и юноши

Да не се използва от деца под 12 години.

Това лекарство съдържа 250 mg пропиленгликол във всяка доза от 2,5 g, което е еквивалентно на 100 mg/g. Пропиленгликол може да предизвика раздразнение на кожата.

Други лекарства и Дийп Рилийф гел

Избягвайте едновременната употреба с аспирин или други нестероидни противовъзпалителни средства.

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Бременност, кърмене и фертилитет

Бременните жени и кърмачките трябва да избягват употребата на Дийп Рилийф гел. Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Локалното приложение на Дийп Рилийф гел не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

3. Как да използвате Дийп Рилийф гел

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Възрастни и деца над 12 години.

Дийп Рилийф гел се нанася върху засегнатата зона с леки масажни движения до пълното му попиване. Апликацията се повтаря, но не повече от 3 пъти дневно. Да не се нанася на интервали по-малки от 4 часа. За всяка апликация се използва 1-4 см от гела.


Гелът е подходящ за употреба по време на физиотерапевтични процедури (ултразвук, йонофореза).

Ако след две седмици не настъпи подобрене, задължително се провежда консултация с лекар.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Дийп Рилийф гел

Предозирането е малко вероятно поради локалното приложение на препарата.

Симптомите от предозиране на ибупрофен включват главоболие, повръщане, сънливост, хипотензия.



Ако сте пропуснали да използвате Дийп Рилийф гел

Не употребявайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Възможни са кожни реакции на мястото на приложение (обриви, изгаряния, сърбеж и уртикария), както и стомашни проблеми (стомашни болки, диспепсия).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София. Тел.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Дийп Рилийф гел

Да се съхранява под 25°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Дийп Рилийф след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Дийп Рилийф

- Активните вещества са: ибупрофен 50 mg/g и левоментол 30 mg/g.
- Другите съставки са: пропиленгликол, диизопропаноламин, карбомер, денатуриран етанол, дестилирана вода.

Как изглежда Дийп Рилийф и какво съдържа опаковката

Дийп Рилийф е прозрачен, безцветен гел за локално приложение. Предлага се в алуминиеви туби с маса на напълване 50 g, поставени в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Colep Laupheim GmbH & Co.KG,
Fockstrasse 12, 88471 Laupheim,
Германия

Производител:
The Mentholatum Company Ltd.
1 Redwood Avenue
Peel Park Campus
East Kilbride, G74 5PE
Великобритания



Дата на последно преразглеждане на листовката: март 2019 г.

