

Листовка: информация за потребителя № 20060753

Диокет 600 mg таблетки
Dioket 600 mg tablets

Диосмин (Diosmin)

Разрешение № 36614, 17-02-2017

Особление №

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ в случай, че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт

В тази листовка:

1. Какво представлява Диокет и за какво се използва
2. Преди да приемете Диокет
3. Как се прилага Диокет
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Диокет
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Диокет и за какво се използва

Диокет принадлежи към групата на венотоничните (понижаващи тонуса на мускулатурата в стените на вените) и вазопротективни (укрепващи малките кръвоносни съдове) средства.

Диокет се използва при възрастни за:

- Лечение на симптоми, свързани с венозно-лимфна недостатъчност (проблеми с венозния кръвоток): тежест в краката, болка, първоначален дискомфорт в легнalo положение
- Лечение на функционалните симптоми при хемороидална криза
- Допълващо лечение при функционални нарушения, свързани с чупливост на капилярите

2. Преди да приемете Диокет

Не приемайте Диокет:

- Ако сте алергични (свръхчувствителни) към диосмин или към някоя от останалите съставки на Диокет (вж. точка 6. Допълнителна информация).

Обърнете специално внимание при употребата на Диокет

За постигането на пълна ефективност от лечението е необходимо спазването на определен здравословен начин на живот. Избягвайте прекомерното излагане на топлина и продължителното стоеще прав, както и наднорменото тегло. Разходките и ходенето на



подходящи (медицински) чорапи, могат да имат благоприятен ефект върху Вашето кръвообръщение.

При хемороидална криза прилагането на диосмин не отменя специфичното лечение на други анални заболявания. Лечението трябва да бъде краткотрайно - не повече от 15 дни. Ако симптомите все още съществуват или се влошат, трябва да се направи проктологична оценка и лечението да се преразгледа.

Прием на други лекарства

Няма данни за взаимодействието на диосмин с други лекарства или други форми на взаимодействие. Въпреки това, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или накъсно сте приемали други лекарства, включително и такива, отпусканни без рецептa.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Уведомете Вашия лекар ако сте бременна, тъй като само той може да реши дали е необходимо да приемате Диокет. Поради липса на данни за изльчването на диосмин в кърмата не се препоръчва кърмене по време на лечението.

Шофиране и работа с машини

Няма данни относно влиянието на Диокет върху способността за шофиране или работа с машини.

3. Как се прилага Диокет

Перорално приложение.

Обичайната дозировка е:

- Венозна недостатъчност: 1 таблетка дневно, сутрин преди закуска
- Хемороидална криза: 2-3 таблетки дневно, по време на хранене

Ако сте пропуснали да приемете доза Диокет

Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата; изчакайте определеното време за следващата доза.

Ако сте приели повече от необходимата доза Диокет

Няма данни за предозиране. Ако смятате, че сте приели повече от необходимата доза Диокет, моля уведомете Вашия лекар, той ще прецени какви действия да предприемете.

Ако имате никакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този лекарствен продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Диокет може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Известни са случаи на нарушение на храносмилането, които рядко изискват преустановяване на лечението.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележителна, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.



5. Как да съхранявате Диокет

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Диокет след изтичане срока на годност отбелзан върху опаковката. Срока на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

6. Допълнителна информация

Какво съдържа Диокет

Активното вещество е диосмин.

Другите съставки са: поливинилпиролидон К30, микрокристална целулоза, царевично нишесте и магнезиев стеарат.

Всяка таблетка Диокет съдържа 600 mg диосмин.

Как изглежда Диокет и какво съдържа опаковката

Диокет се предлага под формата на таблетки, опаковани в блистери. Всяка картонена кутия съдържа 30 таблетки (2 блистера по 15 таблетки).

Притежател на разрешението за употреба

Stragen France SAS, 52 Rue de la République, 69002 Lyon, Франция

Производител

Phameal laboratoires, 11 rue de Montbazon, 37260 Monts, Франция

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Ю СИ БИ България ЕООД тел.: (02) 962 30 49

Дата на последно актуализиране на листовката 01/2017

