

Листовка: информация за потребителя

ЕУКАРБОН таблетки EUCARBON® tablets

Сена, лист 105 mg; Ревен, сух екстракт от корен 25 mg; Растителен въглен 180 mg;
Пречистена сяр 50 mg

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт. Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след няколко дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Еукарбон и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Еукарбон
3. Как да приемате Еукарбон
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Еукарбон
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Еукарбон и за какво се използва

- Активните вещества, които Еукарбон съдържа са само от растителен и минерален произход. Те регулират храносмилането и имат меко слабително действие. Растителният въглен има способността да свързва различни токсични продукти от обмяната на веществата, които впоследствие се отделят благодарение на слабителното действие на листата от сена и екстракта от ревен. Сярата има също леко дезинфекциращо действие по отношение на стомашно-чревния тракт.
- Мекото слабително действие на Еукарбон започва 8-10 часа след приемане.
- Малък брой пациенти, страдащи от запек, дължащ се на Синдром на раздразненото черво, показват добро повлияване при употребата на Еукарбон.

Показания:

Запек

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Еукарбон

Не приемайте Еукарбон

- ако сте алергични към листа от сена, екстракт от ревен, растителен въглен, пречистена сяр или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
- ако имате запушване на червата
- ако имате възпаление на червата
- ако имате болки в корема с неизвестен произход
- ако имате тежки нарушения на водно-електролитното равновесие
- ако имате съмнения за язви на стомаха или червата
- ако имате възпаление на апендикса.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20010863
Разрешение №	B6/MN/MK-45-198
Одобрение №	11-04-2019



В тези случаи е необходима консултация с лекар.

Да не се употребява от деца под 12 години.

Да не се употребява по време на бременност и кърмене.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Еукарбон.

Обърнете специално внимание при употребата на Еукарбон

- ако след прием на лекарствения продукт симптомите продължават или състоянието се влоши. Необходимо е веднага да се обърнете за съвет към лекар.
- в случай на бременност. Необходимо е веднага да съобщите на Вашия лекар за настъпването на бременност.

Дозата, необходима за желаните ефект, може да бъде индивидуално различна.

Не трябва да се приема за дълъг период от време (повече от 1 до 2 седмици) без консултация от лекар.

Еукарбон не трябва да се приема за отслабване.

В случай на продължително и непрекъснато приемане за повече от 14 дни ефектът може да намалее.

Деца

Да не се употребява от деца под 12 години.

Други лекарства и Еукарбон

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Ако приемате лекарства за сърце

При случаи на повишени загуби на калий (недостиг на калий), може да се засили действието на някои лекарства за сърце (сърдечни гликозиди).

Еукарбон с храна и напитки

Еукарбон се приема по време и след хранене.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Еукарбон не трябва да се употребява по време на бременност и кърмене.

Еукарбон съдържа захароза

Една таблетка съдържа 43,4 mg захар (захароза) и е подходяща за диабетици.

Моля, консултирайте се с Вашия лекар преди да приемете този лекарствен продукт ако знаете, че имате непоносимост към някои захари.

3. Как да приемате Еукарбон

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.



Ако Вашият лекар не е предписал друго, обичайната доза за възрастни и деца над 12 години е 1-2 таблетки до 3 пъти дневно по време или след хранене, с цел постигане на леко слабително действие и намаляване на подуването. Дозата, необходима за очаквания ефект, може да бъде индивидуално различна. За по-силен слабителен ефект, дозата може да се увеличи до 3-4 таблетки вечер. Максималната дневна доза е 8 таблетки и не трябва да се превишава.

Еукарбон таблетки трябва да се приемат с достатъчно течности (най-малко една чаша вода).

Ако сте приели повече от необходимата доза Еукарбон

Появата на диария е признак за предозиране. В този случай трябва да се намали дозировката или да се спре приемането на Еукарбон.

Ако сте пропуснали да приемете Еукарбон

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някъкви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

- В единични случаи може да се наблюдават болки в корема и диария.
- В много редки случаи (по малко от 1 човек на 10 000) може да се получи гадене или повръщане – това може да бъде признак за предозиране.
- При прилагането на високи дози за по-продължително време може да се стигне до електролитни загуби, най-вече до загуби на калий, което се изразява в мускулна слабост и засилен запек, дължащи се на ограничената дейност на червата.
- Понякога може да се наблюдава леко червено оцветяване на урината при алкална реакция, което обаче не е клинично значимо.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Еукарбон

- Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
- Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонната опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.



Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Еукарбон

Активните вещества са:

- Сена, лист	105 mg
- Ревен, сух екстракт от корен	25 mg
- Растителен въглен	180 mg
- Пречистена сяр	50 mg

Другите съставки (помощни вещества) са: захароза; царевично нишесте; каолин, тежък; талк; арабска гума; резене, масло; лютива мента, масло.

Как изглежда Еукарбон и какво съдържа опаковката

Сиво-черни таблетки без делителна черта.

Опаковки по 10, 30, 500 и 1000 броя.

Притежател на разрешението за употреба и производител

F. Trenka chem.- pharm. Fabrik GmbH, Prinz-Eugen-Straße 70, 1040 Vienna, Австрия

Дата на последно одобрение на листовката: 10/2018

