

Б. ЛИСТОВКА



Листовка: информация за потребител

Фелоран® 1% гел

Feloran® 1% gel

диклофенак натрий (diclofenac sodium)

98622

RG/МК/МВ-57190

10 -01- 2019

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите никакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.
- Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Фелоран гел и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Фелоран гел
3. Как да използвате Фелоран гел
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Фелоран гел
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Фелоран гел и за какво се използва

Фелоран гел съдържа активно вещество диклофенак натрий, което принадлежи към група лекарства, наречени нестероидни противовъзпалителни средства. Диклофенак облекчава симптомите на възпаление – болка и оток. Гелът е специално разработен за постигане на бърза резорбция на диклофенак през кожата и бързо облекчаване на болката.

Фелоран гел е показан при:

- травми на сухожилията, ставните връзки, мускулите и ставите, дължащи се на навсяхвания, изкълчвания, разтежения, натъртвания и болки в гърба (спортни травми);
- локализирани форми на извънставен ревматизъм - възпаления на сухожилията (например „тенис лакът”), бурсити (болка и оток в и около ставите), синдром рамо-ръка, периартропатия;
- локализирани форми на дегенеративни ставни заболявания, например остеоартрит на периферните стави и гръбначния стълб.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Фелоран гел

Не използвайте Фелоран гел

- ако сте алергични към активното вещество или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
- ако сте свръхчувствителни към аспирин или други нестероидни противовъзпалителни средства с клинична проява на астматичен пристъп, уртикария или алергичен ринит;
- ако сте на възраст под 14 години;
- в последните три месеца на бременността.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Фелоран гел.



Ако имате стомашна или дуоденална язва, сърдечно-съдова недостатъчност (сърдечно заболяване, което може да доведе до лесна уморяемост, задух, подуване на глезените и др.), бъбречни или чернодробни проблеми.

Гелът се прилага само върху здрава кожа (при липса на отворени рани и наранявания). Не се прилага върху очите и лигавиците.

Не се прилага под превръзка, не се приема през устата.

Намазаната повърхност на кожата да не се излага на слънчева светлина.

В случай на кожни или други признания на свръхчувствителност приложението на лекарството трябва да бъде преустановено.

Други лекарства и Фелоран гел

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, накърно сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Взаимодействията с други лекарства са малко вероятни при приложение на Фелоран гел върху кожата.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятайте, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Употребата на Фелоран гел не се препоръчва по време на бременност и в периода на кърмене.

Шофиране и работа с машини

Фелоран гел се прилага върху кожата. Не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Фелоран гел съдържа пропиленгликол, който може да окаже дразнещо действие върху кожата.

В състава на продукта като помощно вещество се съдържа натриев бензоат, който може да окаже слабо дразнещо действие върху кожата, очите и лигавиците.

3. Как да използвате Фелоран гел

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Фелоран гел се прилага върху кожата. Обичайното приложение е:

Възрастни и юноши над 14 години: гелът се нанася върху засегнатия участък 3-4 пъти дневно и внимателно се втрива, докато се поеме от кожата. Необходимото количество гел зависи от размера на засегнатото място. Например 2 g гел (около 6 см) са достатъчни за намазване на площ около 400 см². След всяко приложение ръцете трябва да се измиват, освен ако те не са третираното място.

Продължителността на лечението зависи от показанията и постигнатия ефект.

- При травма или ревматизъм на меките тъкани – не се препоръчва гелът да се употребява повече от 14 дни, освен ако това не е назначено от лекар.
- При артритни болки (възрастни над 18 години) – не се препоръчва употреба повече от 21 дни, освен ако лечението не е назначено от лекар.

Когато Фелоран гел се използва без лекарско предписание при посочените индикации, е необходима консултация с лекар, ако състоянието на пациентите не се подобри в рамките на 7 дни или се влоши.

Деца под 14 години: приложение на продукта в тази възрастова група е противопоказано.

Пациенти в напредната възраст (над 65 години): използва се в обичайната дозировка.

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Фелоран гел



Тъй като продуктът се прилага върху кожата, предозиране е малко вероятно. При инцидентно поглъщане през устата на големи количества от продукта, потърсете лекувация Ви лекар или се обърнете към най-близкото лечебно заведение.

Ако сте пропуснали да използвате Фелоран гел

Ако сте пропуснали да приложите дозата и наближава времето за следващата доза, приложете я както обикновено. Не използвайте двойно количество от лекарството при следващото приложение.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

При прилагане върху кожата често (при по-малко от 1 на 10 пациенти) са възможни: зачеряване, сърбеж, обриви, екзема, лющене и сухота на кожата.

В редки случаи (при по-малко от 1 на 1 000 пациенти) може да се наблюдава подуване и образуване на мехурчета по кожата на мястото на приложение.

Много рядко (по-малко от 1 на 10 000 пациенти) - кожен обрив с мехури пълни с гной; алергични реакции, протичащи с подуване на лицето, устните, устата, езика или гърлото, често придружени с обрив и сърбеж, което може да предизвика трудности при проглатване; свиркане в гърдите или недостиг на въздух (симптоми на астма); повишена чувствителност на кожата при излагане на слънце.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

5. Как да съхранявате Фелоран гел

Този лекарствен продукт не изисква специални температурни условия на съхранение. Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Срок на годност след отваряне на тубата - до 6 (шест) месеца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелзан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Фелоран гел

- Активното вещество е диклофенак натрий 10 mg в 1 g гел.
- Другите съставки са: карбомери, полиетиленгликол 400, пропиленгликол, диетаноламин, изопропилов алкохол, натриев бензоат, пречистена вода.

Как изглежда Фелоран гел и какво съдържа опаковката

Прозрачна, безцветна желеобразна маса със специфичен мириз на изопропилов алкохол.



60 g или 120 g продукт се дозират в мембрани алюминиеви туби, затворени с капачки от полипропилен; по 1 туба в картонена кутия, заедно с листовка. Преди първото използване алюминиевото фолио на отвора се пробива!

Притежател на разрешението за употреба и производител
СОФАРМА АД
ул. Илиенско шосе 16, 1220 София, България

Дата на последно одобрение на листовката: октомври, 2018 г.

