

Листовка: информация за потребителя

Фервекс за възрастни с вкус на малина 500 mg/25 mg/200 mg гранули за перорален разтвор
Парацетамол/Фенирамин малеат/Аскорбинова киселина

Fervex Adults Raspberry 500 mg/25 mg/200 mg granules for oral solution
Paracetamol/Pheniramine maleate/Ascorbic acid

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 5 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Фервекс за възрастни с вкус на малина и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Фервекс за възрастни с вкус на малина
3. Как да приемате Фервекс за възрастни с вкус на малина
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Фервекс за възрастни с вкус на малина
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Фервекс за възрастни с вкус на малина и за какво се използва

Ако след 5 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Това лекарство се използва за лечение на: простуда, алергичен ринит, ринофарингит и грипозодобни състояния при възрастни и деца на и над 15 години:

- намалява секрецията от носа и сълзенето,
- кихане,
- повишена телесна температура,
- лека до умерена болка от различен произход.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Фервекс за възрастни с вкус на малина

Не приемайте Фервекс за възрастни с вкус на малина

- ако сте алергични към парацетамол или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
- деца под 15 години
- някои форми на глаукома (увеличено вътреочно налягане)
- заболявания на простатата и пикочните пътища
- сериозно чернодробно заболяване поради наличието на парацетамол.



Като правило, Вие не трябва да употребявате това лекарство, ако сте бременна или кърмите, освен ако Вашият лекар не Ви каже, че може.

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Специални предупреждения

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

- Дозировката, продължителността на лечение от 5 дни и противопоказанията трябва да бъдат стриктно наблюдавани.
- Не е препоръчителна употребата на алкохол, лекарства съдържащи алкохол или седативни лекарства по време на лечението.

Консултирайте се веднага с лекар в случай на предозиране или случайно приемане на свръх висока доза.

Това лекарство съдържа парацетамол и фенирамин. Други лекарства също съдържат тези вещества. Не комбинирайте такива лекарства, за да не надхвърлите препоръчителната дневна доза (виж "Дозировка").

Информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Не се препоръчва употребата на това лекарство от пациенти с непоносимост към фруктоза, синдром на глюкозо-галактозна малабсорбция или захарозо-изомалтазна недостатъчност (рядко наследствено заболяване).

Всяко саше съдържа 11,5 g захароза, което трябва да се вземе под внимание при хранителен режим с ниско съдържание на захар или диабет.

Това лекарство съдържа азолов оцветителен агент (E 110), което може да причини алергична реакция.

Ако страдате от:

- тежко бъбречно или чернодробно заболяване;
- ако сте предразположени към запек, виене на свят или заболяване на пикочните пътища, това лекарство трябва да се използва само по лекарска препоръка.

Консултирайте се с Вашия лекар в случай на изтичане на гнойни секрети от носа, симптоми на повишена температура или липса на подобрене след 5 дни от началото на лечението.

Други лекарства и Фервекс за възрастни с вкус на малина

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

За да избегнете вредните ефекти от предозиране, не комбинирайте с други лекарства съдържащи антихистамини или парацетамол без консултация с лекар.

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Фервекс за възрастни с вкус на малина с храна и напитки

Това лекарство може да предизвика сънливост, която може да се повиши при прием на алкохол.

Препоръчително е лечението да бъде започнато вечер и да не се приема алкохол по време на лечението.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.



Бременност: не се препоръчва приема на това лекарство по време на бременност.

Кърмене: не се препоръчва приема на това лекарство по време на кърмене.

Шофиране и работа с машини

Хората, които шофират моторни превозни средства или работят с машини, трябва да бъдат предупредени за риска от сънливост при употребата на това лекарство.

Този ефект се усилва при прием на алкохол или лекарства, съдържащи алкохол или седативни лекарства.

Фервекс за възрастни с вкус на малина съдържа захароза и оцветителен агент Сънсет жълто S (E 110).

3. Как да приемате Фервекс за възрастни с вкус на малина

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дозировка

Възрастни и деца на и над 15 години:

По 1 саше, като интервалът между два приема трябва да бъде най-малко 4 часа, без да се надхвърлят 3 сашета дневно.

Начин на приложение

Перорално приложение.

Съдържанието на сашето трябва да се приема с достатъчно количество гореща или студена вода.

При грипоподобни състояния е по-добре лекарството да се приема вечер с гореща вода.

Честота на приема

В случай на тежка бъбречна недостатъчност (креатининов клирънс < 10 ml/min) интервалът между два приема трябва да бъде най-малко 8 часа.

Продължителност на лечението

Продължителността на лечение не трябва да надхвърля 5 дни.

Ако сте приели повече от необходимата доза Фервекс за възрастни с вкус на малина

Прекратете лечението и се консултирайте незабавно с Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да приемете Фервекс за възрастни с вкус на малина

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

- Настъпване на остър пристъп на глаукома при хора, които имат такова предразположение.
- Нарушения при уриниране (значително намаляване на урината, затруднено уриниране).
- Сухота в устата, нарушения на акомодацията (способността на окото да се нагласява за виждане на различни разстояния), запек.
- Нарушения на паметта или концентрацията, объркване, световъртеж (по-често при пациенти в старческа възраст).
- Липса на координация в движенията, треперене.



- Сънливост, понижено внимание – по-ясно изразено в началото на лечението.
- Понижение на кръвното налягане при движение или изправяне, което може да бъде придружено със световъртеж.
- Съобщава се за редки случаи на кожен обрив, зачервяване на кожата или алергична реакция под формата на внезапен оток на лицето или шията, или внезапно неразположение с понижено на кръвното налягане. Лечението трябва незабавно да се преустанови, да се потърси съвета на лекар и да не се приемат повече лекарства съдържащи парацетамол или фенирамин.
- Съобщава се за няколко редки случая на промяна в резултатите на лабораторните изследвания, напр. много ниски нива на някои бели кръвни телца или тромбоцити, което може да доведе до кървене от носа или венците. В такъв случай се консултирайте с лекар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно (вижте детайлите по-долу). Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Изпълнителна Агенция по Лекарствата

София 1303, ул. Дамян Груев 8

Тел.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

5. Как да съхранявате Фервекс за възрастни с вкус на малина

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява под 25°C.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Фервекс за възрастни с вкус на малина

- Активните вещества са: парацетамол 500 mg, фенирамин малеат 25 mg, аскорбинова киселина 200 mg
- Другите съставки са: акация, безводна лимонена киселина, захарин натрий, захароза и малинов аромат (съдържащ Сънсет жълто S (E 110)).

Как изглежда Фервекс за възрастни с вкус на малина и какво съдържа опаковката

Гранули за перорален разтвор – 6 или 8 сашета в кутия.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

UPSA SAS



3, Rue Joseph Monier,
92500 Rueil-Malmaison,
Франция

Производители

UPSA SAS
979, avenue des Pyrénées
47520 Le Passage, Франция

или

UPSA SAS
304, avenue du Docteur Jean Bru
47000 Agen, Франция

Дата на последно преразглеждане на листовката: 12/2018

