

Листовка: информация за потребителя

Гавискон Ягода Таблетки 250 mg / 133,5 mg / 80 mg таблетки за дъвчене
Натриев алгинат/Натриев водороден карбонат/Калциев карбонат

Gaviscon Strawberry Tablets 250 mg / 133,5 mg / 80 mg chewable tablets
Sodium alginate/Sodium hydrogen carbonate/Calcium carbonate

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 7 дена не се почувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Гавискон Ягода Таблетки и за какво се използва
 2. Какво трябва да знаете преди да използвате Гавискон Ягода Таблетки
 3. Как да използвате Гавискон Ягода Таблетки
 4. Възможни нежелани реакции
 5. Как да съхранявате Гавискон Ягода Таблетки
 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| ДОПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА | |
| Листовка - Приложение 2 | |
| Към Рег. № | 20150089 |
| Разрешение № | BG/MAMR-49724 |
| Одобрено на | 25-02-2019 |
1. Какво представлява Гавискон Ягода Таблетки и за какво се използва

Гавискон Ягода Таблетки спада към група лекарства, наречени „супресори на рефлукса“, които образуват защитен слой по повърхността на стомашното съдържимо, за да възпрепятства изтичането на стомашна киселина от стомаха към хранопровода, където причинява болка и дискомфорт.

Това лекарство се използва за лечение на симптоми на гастро-езофагеален рефлукс, като киселинна регургитация, киселини от стомаха и нарушено храносмилане (свързани с рефлукса), които могат да се появят като например след хранене или по време на бременност, или при пациенти със симптоми свързани с рефлукс езофагит.

Ако след 7 дена не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

2. Какво трябва да знаете преди да използвате Гавискон Ягода Таблетки

Не приемайте този продукт:

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към някоя от съставките на Гавискон Ягода Таблетки, тъй като много рядко е възможно да се появят затруднено дишане и кожни обриви (виж информацията по-долу за пълния списък на нежелани реакции)

Предупреждения и специални мерки

Този лекарствен продукт съдържа натрий (10,6 mmol за доза от 4 таблетки) и калий (2,5 mmol за доза от 4 таблетки).

- Ако сте посъветвани да спазвате строга ограничителна диета по отношение на тези



- соли, моля консултирайте се с Вашия лекар преди да приемете този продукт.
- Ако страдате от сериозно бъбречно или сърдечно заболяване, посъветвайте се с Вашия лекар относно количеството на тези соли, тъй като такива соли могат да повлияят на тези заболявания.

Този лекарствен продукт съдържа аспартам. Ако страдате от фенилкетонурия трябва да имате предвид, че този лекарствен продукт е подсладен с аспартам, източник на фенилаланин.

Прием на други лекарства:

Не приемайте този лекарствен продукт в рамките на 2 часа от приема на други лекарствени продукти през устата, тъй като може да повлияе действието на другите лекарствени продукти.

Бременност и кърмене:

Този лекарствен продукт може да се прилага по време на бременност и кърмене.

3. Как да използвате Гавискон Ягода Таблетки

За перорална употреба. Сдъвчете добре таблетката преди да преглътнете.

Възрастни, включително в старческа възраст и деца над 12-годишна възраст: При появата на симптоми вземете 2 до 4 таблетки след хранене и преди сън.

Деца под 12-годишна възраст: Трябва да се прилага по лекарска препоръка.

Ако пропуснете приема на една доза, не приемайте двойна доза следващия път, а продължете обичайния прием на лекарствения продукт.

Ако сте приели по-голямо количество отколкото трябва може да почувствате подуване на корема. Малко е вероятно това да Ви навреди, въпреки това, моля консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Много рядко (по-малко от 1 на 10 000) може да се наблюдават алергични реакции към помощните вещества. Симптомите могат да включват кожни обриви, сърбеж, затруднено дишане, замаяност или отоци на лицето, устните, езика или гърлото. Ако някоя от тези нежелани реакции стане сериозна или ако забележите реакции неописани в тази листовка спрете приема и веднага се консултирайте с Вашия лекар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или ако забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване,

Изпълнителна Агенция по Лекарствата

София 1303, ул. Дамян Груев 8

тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434

e-mail: bda@bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Гавискон Ягода Таблетки

Не използвайте Гавискон Ягода Таблетки след изтичане срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера.

Само за пропиленовата опаковка: Да се използва до 6 месеца след отваряне.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява при температура под 25°C.



6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа този лекарствен продукт

Всяка таблетка за дъвчене съдържа 250 mg натриев алгинат, 133,5 mg натриев хидрогенкарбонат и 80 mg калциев карбонат като активни вещества.

Другите съставки са: манитол (E421), макрогол 20 000, аспартам (E951), аромат на ягода (малтодекстрин, модифицирано нишесте (E1450), растително масло, пропилен гликол (E1520), червен железен оксид (E172), ксилитол, кармелоза натриева сол, магнезиев стеарат.

Таблетките не съдържат захар и глутен.

Как изглежда Гавискон Ягода Таблетки и какво съдържа опаковката

Гавискон Ягода Таблетки представляват светло розови, кръгли със скосени краища таблетки с мирис и вкус на ягода. Таблетките са с маркировка - сабя и кръг от едната страна и GS250 от другата страна.

Гавискон Ягода Таблетки се предлагат в следните опаковки:

Блистерни опаковки от 4, 6, 8, 16, 24, 32, 48 и 64 таблетки за дъвчене поставени в картонена кутия.

Полипропиленова опаковка: 8, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 2 x 16, 2 x 18, 2 x 20, 2 x 22 или 2 x 24 таблетки за дъвчене.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Reckitt Benckiser (Romania) S.R.L.

89-97 Grigore Alexandrescu Str., Building A, 5th floor, district 1

Bucharest, Румъния

Производител

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, Обединено кралство

Дата на последно преразглеждане на листовката: ноември, 2018

