



Листовка: информация за потребителя

ГелоМиртол® форте 300 mg стомашно-устойчиви капсули, меки
Дестилат от смес от пречистени етерични масла от евкалипт, сладък портокал,
мирта и лимон (66:32:1:1)

GeloMyrtol® forte 300 mg gastro-resistant capsules, soft
Distillate of a mixture of rectified essential oils of eucalyptus, sweet orange, myrtle
and lemon (66:32:1:1)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.
- Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява ГелоМиртол® форте и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете ГелоМиртол® форте
3. Как да приемате ГелоМиртол® форте
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ГелоМиртол® форте
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява ГелоМиртол® форте и за какво се използва?

ГелоМиртол® форте са стомашно-устойчиви капсули, меки
ГелоМиртол® форте се използва за симптоматично лечение на остри и хронични
bronхити и синусити.

ГелоМиртол® форте повлиява секрецията и кашлицата при заболявания на
дихателните пътища, втечнява сгъстения секрет, засилва отделянето му,
улеснява отхрачването и има противовъзпалителен ефект.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете ГелоМиртол® форте

Не приемайте ГелоМиртол® форте



- ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество или някоя от останалите съставки на ГелоМиртол® форте.

Предупреждения и предпазни мерки

Ако след прием на лекарствения продукт симптомите продължават или състоянието се влоши, да се направи консултация с лекар.

Други лекарства и ГелоМиртол® форте

Няма известни взаимодействия с други лекарства.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

ГелоМиртол® форте с храна и напитки

Капсулите ГелоМиртол® форте се приемат ½ час преди хранене с голямо количество хладна течност.

Бременност, кърмене и фертилитет

Въпреки че липват съобщения за тератогенен ефект по време на бременност, особено през първото тримесечие, ГелоМиртол® форте може да се прилага само след консултация с лекар.

Възможно е преминаване на ГелоМиртол® форте в майчиното мляко поради липофилни свойства.

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

ГелоМиртол® форте няма влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

ГелоМиртол® форте съдържа сорбитол.

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

3. Как да приемате ГелоМиртол® форте

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е: За възрастни и деца над 10 години при остри възпаления по 1 капсула 3-4 пъти дневно; при хронични заболявания се приема по 1 капсула 2 пъти на ден, като тази дозировка се препоръчва и за поддържаща терапия.

При хронични бронхити за улесняване на сутрешното отхрачване се приемат по 1 капсула ГелоМиртол® форте допълнително вечер преди лягане.

За по-добър сън последната доза да се приема преди лягане.



Продуктът не е подходящ за деца под 10 годишна възраст.

Продължителност на лечението

Продължителността на лечението с ГелоМиртол® форте зависи от оплакванията. При хронични заболявания на дихателните пътища е възможно приемане на медикамента продължително време.

Ако сте приели повече от необходимата доза ГелоМиртол® форте?

Ако сте приели по-голямо количество ГелоМиртол® форте, следните мерки трябва да бъдат предприети от Вашия лекар:

Течен парафин 3ml/kg тегло перорално, промивка на стомаха с 5 % разтвор на натриев бикарбонат, поставяне на кислородна маска.

Ако сте пропуснали да приемете ГелоМиртол® форте

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

В единични случаи могат да се появят оплаквания в стомашно-чревната област, като подуване, болка, гадене, диария, както и да настъпи раздвижване на намиращи се в жлъчката и бъбреците камъни.

В отделни случаи се наблюдават алергични реакции /напр. обриви по кожата, отоци по лицето, задух или нарушения в кръвообръщението/.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата:

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Тел.: +359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате ГелоМиртол® форте?

Да се съхранява под 25 °C!

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.



Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Срок на годност

Срокът на годност на продукта е 3 години.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа ГелоМиртол® форте

- Активните вещества са: 300 mg дестилат от смес от пречистени етерични масла от евкалипт, сладък портокал, мирта и лимон
-
-
- Помощни вещества: рапично масло, рафинирано, желатин, глицерол 85 %, сорбитол, течен (некрystalизиращ), хипромелоза ацетат сукцинат, триетилов цитрат, натриев лаурилсулфат, талк, декстрин, амониев глицеризат, хлороводородна киселина, разредена

Как изглежда ГелоМиртол® форте и какво съдържа на опаковката
Стомашно-устойчиви капсули, меки по 20, 50 и 100 броя в опаковка

Притежател на разрешението за употреба и производител

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG

Kieler Strasse 11

25551 Hohenlockstedt

Германия

Дата на последна редакция на листовката

Юни 2016

