

Листовка: Информация за потребителя

**Хексоралетен Н 5 mg/1,5 mg таблетки за смучене
Hexoraletten N 5 mg/1.5 mg lozenges**

Хлорхексидинов дихидрохлорид (*chlorhexidine dihydrochloride*); бензокаин (*benzocaine*)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 7 дни не се почувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Хексоралетен Н и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Хексоралетен Н
3. Как да приемате Хексоралетен Н
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Хексоралетен Н
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20020971
Разрешение №	39666 / 3-11-2017
Одобрение №	/

1. Какво представлява Хексоралетен Н и за какво се използва

Хексоралетен Н са таблетки за смучене, предназначени за локално приложение с цел намаляване (редукция) на броя на микроорганизмите в гърлото и устната кухина, лечение на възпалено гърло, стоматит (възпаление на устната кухина), гингивит (възпаление на венците).

Предотвратяване на инфекции и/или възпаление на устната кухина.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Хексоралетен Н

Не приемайте Хексоралетен Н

- ако сте алергични към хлорхексидин или бензокаин или към някоя от останалите съставки на Хексоралетен Н.

Предупреждения и предпазни мерки


Обърнете специално внимание при употребата на Хексоралетен Н

Бензокаин може да предизвика метхемоглобинемия, рядко, но сериозно състояние което трябва да бъде незабавно лекувано, защото намалява количеството кислород, пренасяно в кръвта. Употребата трябва незабавно да се спре и веднага да се потърси медицинска помощ, ако кожата на пациента или детето стане бледа, сива или синкава, както и устните и ноктите, има главоболие, световъртеж, недостиг на въздух, умора и тахикардия (бързо сърцебиене).

Да се използва внимателно при по-малки деца и лица с аспирация и проблеми с преглъщането, тъй като има възможност от задавяне с таблетките за смучене.

Ако симптомите продължават или се влошават или ако възникнат нови симптоми, употребата трябва да се спре и да се потърси консултация с лекар.

Не трябва да се използва, ако има рани и разязвявания в устата и гърлото.



Поради локалното анестезиращо действие на бензокаин, веднага след приема на таблетката за смучене трябва да се избягва ядене или пиене.

Други лекарства и Хексоралетен Н

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност, кърмене и фертилитет

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Хлорхексидин/бензокаин/ не трябва да се използва по време на бременност или кърмене, освен ако потенциалната полза от лечението на майката не надхвърля риска за развиващия се плод или кърмачето.

Шофиране и работа с машини

Не е известно дали Хексоралетен Н повлиява способността за шофиране и работа с машини.

3. Как да приемате Хексоралетен Н

Дозировка:

Възрастни и деца над 12 години:

Няколко пъти на ден по 1 таблетка за смучене. При нужда може да се смуче по една таблетка на всеки 1 – 2 часа до максимална доза от 8 таблетки (12 mg/40 mg) за смучене дневно.

Деца (6– 12 години):

Няколко пъти на ден по 1 таблетка за смучене. До 4 таблетки за смучене (6 mg/20 mg) на ден.

Начин на приложение:

Таблетките за смучене се държат в устата, докато се разтворят.

Лечението трябва да започне по възможност веднага след появата на първите симптоми и да продължи няколко дни като превантивна мярка след отзвучаване на оплакванията.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Възможни нежелани реакции: с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка):

- метхемоглобинемия (кръвно заболяване, при което в резултат на ензимен дефект или под действието на различни вещества в организма се синтезира патологичен метхемоглобин)
- свръхчувствителност (включително уртикария, ангиоедем, анафилактични реакции включително и анафилактичен шок)
- орална хипоестезия (намалена чувствителност в устната кухина)
- изтръпване на езика
- дисгеузия (нарушения на вкуса)
- промяна на цвета на зъбите
- промяна на цвета на езика (обратима)
- промяна на цвета на силиката и на комбинираните зъбни пломби
- отлагания по зъбите (зъбен камък)
- стоматит (възпаление на лигавицата на устната кухина)



- эксфолиране на лигавицата на устата
- глосодиния (болево усещане в областта на езика)
- увеличение на паротидната жлеза.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване в:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Хексоралетен Н

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се съхранява под 25°C.

Не използвайте Хексоралетен Н след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Хексоралетен Н

- Активните вещества са: хлорхексидинов дихидрохлорид и бензокаин.
- Другите съставки са: изомалт, пречистена вода, аспартам, масло лютивя мента, ментол, тимол.

Как изглежда Хексоралетен Н и какво съдържа опаковката

Опаковки с 2 блистера, съдържащи 10 таблетки за смучене/блистер.

Притежател на разрешението за употреба

McNeil Products Limited

c/o Johnson & Johnson Ltd.

Foundation Park, Roxborough Way,

Maidenhead, Berkshire SL6 3UG

Великобритания

Производител:

Soldan Holding + Bonbonspezialitäten GmbH

Höchstatter Strasse 33

D-91325 Adelsdorf

Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

„Джонсън & Джонсън България“ ЕООД

ж.к. Младост 4,

Бизнес Парк София, сграда 4

София 1766

Тел.: 02 489 94 00

Дата на последно преразглеждане на листовката: Юли 2017

