

Б. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
МОБИЛАТ ГЕЛ
MOBILAT GEL

Мукополизахарид полисулфат / Надбъбречен екстракт / Салицилова киселина
Mucopolysaccharide polysulfate/Suprarenal extract/Salycilic acid

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

В тази листовка:

1. Какво представлява Мобилат гел и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Мобилат гел
3. Как да използвате Мобилат гел
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Мобилат гел
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20011215
Разрешение №	37911 / 06-10-2016
Одобрение №	

1. Какво представлява Мобилат гел и за какво се използва

Мобилат гел съдържа комбинация от три активни вещества, които след приложение върху кожата облекчават възпалението, подуването и болката.

Мобилат гел се използва:

- При навяхване, разтягане и контузии, реактивен излив и болка при движение
- Моля кажете на лекар ако симптомите продължават повече от три дни.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Мобилат гел

Не използвайте Мобилат гел

- ако сте алергични (свърхчувствителни) към активните вещества или към някоя от останалите съставки на Мобилат гел.
- върху отворени рани, възпалена или наранена кожа, екзема или мукозни мембрани;
- в областта на гърдите по време на кърмене (вижте също раздел „Фертилитет, бременност и кърмене“)

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Мобилат гел:

- ако имате доказано бъбречно увреждане
- ако имате варицела, с реакции след ваксинация, гъбични или бактериални инфекции на кожата или със специфични кожни заболявания (например туберкулоза, сифилис)



мястото на приложение. Употребата на Мобилат гел е разрешена само ако Вашия лекар изрично Ви е дал указание.

– при деца и юноши, тъй като няма достатъчно опит при тази възрастова група. Трябва да сте сигурни, че децата нямат допир с ръце до областите, където продуктът е приложен.

Други лекарства и Мобилат гел

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Салициловата киселина от Мобилат гел може да увеличи пропускливостта на кожата за локални лекарства, прилагани на същото място. Когато Мобилат гел се прилага на големи кожни площи или за дълго време, може да нарасне честотата на нежеланите лекарствени реакции на метотрексат или да се засили ефектът на медикаментите от сулфанилурейната група, които се използват за намаляване на нивото на кръвната захар.

Фертилитет, бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

По време на бременност, Мобилат гел трябва да се използва само на малки области (< 5 cm²). По време на кърмене Мобилат гел не трябва да се прилага в областта на гърдите. Трябва да се избягва случайна абсорбция от кърмачето на салицилова киселина в резултат на допир с третирани области на тялото. Ако Вашият лекар сметне за необходимо да ви дава Мобилат гел за лечение на големи кожни области, трябва да спрете кърменето в подходящо време. В противен случай, може да има риск за детето, защото способността му да отхвърля токсините все още не е напълно развита при новородените.

Шофиране и работа с машини

Лекарственият продукт не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Мобилат гел съдържа восъчно-спиртна маз и цетостеарилов алкохол, които могат да предизвикат локални кожни реакции (например контактен дерматит).

3. Как да използвате Мобилат гел

Винаги прилагайте Мобилат гел точно както е описано в тази листовка. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Придържайте се към инструкциите за употреба. В противен случай, Мобилат гел няма да прояви своя ефект.

Обичайната доза е:

Мобилат гел се прилага 2-3 пъти дневно.

Обикновено се прилага 5-15 cm от крема върху засегнатата област.

Начин на приложение:

Само за външно приложение

Нанасяйте тънък слой Мобилат гел върху засегнатата област от тялото и внимателно го втрийте. Преди да се облечете, Мобилат гел трябва да бъде оставен да изсъхне върху кожата за няколко минути. Не се препоръчва употребата на оклузивни превръзки.

Мобилат гел не трябва да се приема през устата!



Мобилат гел трябва да се използва само върху ненаранена кожа. Избягвайте приложение върху наранена кожа, отворени рани, очите или мукозни мембрани.

Подходящо е прилагането на Мобилат гел под форма на компреси и в комбинация с физиотерапия.

Продължителност на приложението

Продължителността на лечението се определя от лекуващия ви лекар. Лечение с продължителност над 11 дни обикновено е достатъчно. Не е доказано дали Мобилат гел има някаква терапевтична полза при по-дълго приложение.

Моля консултирайте се с Вашия лекар ако имате усещане, че ефектът мна Мобилат гел е прекалено силен или прекалено слаб. Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приложили повече Мобилат гел , отколкото трябва

Продължете с лечението, както е описано в тази листовка (например не нанасяйте крема по-плътно или по-често от това, което нормално бихте нанасяли).

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, попитайте Вашия лека или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Мобилат гел може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Следните честоти се използват за оценяване на нежеланите реакции:

Много чести ($\geq 1/10$)

Чести ($\geq 1/100$ до $< 1/10$)

Нечести ($\geq 1/1\ 000$ до $< 1/100$)

Редки ($\geq 1/10\ 000$ до $< 1/1\ 000$)

Много редки ($< 1/10\ 000$)

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

Нарушение на кожата и подкожната тъкан

Нечести: локално кожно дразнене

Много редки: контактни алергии

Ако възникнат нежелани лекарствени реакции, трябва да спрете приложението на Мобилат гел . Обикновено след това оплакванията отзвучават, без да са необходими други мерки.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
Тел.: +359 2 8903417



уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Мобилат гел

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 25° С. Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Не използвайте Мобилат гел след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Отваряне на тубата: Перфорирайте защитното фолио, покриващо отворът на тубата с острието на капачката като едновременно натискате и завъртвате. Уверете се, че фолиото е напълно отстранено. Всяка туба Мобилат гел е проверена за точното ѝ тегло. За да се подsigури правилното затваряне на тубата при процеса на пълненето ѝ, се изисква да има въздушен слой. Въпреки него, теглото на пълната туба не се променя.

Срок на годност след първо отваряне на тубата: 12 месеца

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Мобилат гел

- Активните вещества са:

100 g гел съдържат:

Мукополизахарид полисулфат	0,20 g
Надбъбречен екстракт	1,08 g
Салицилова киселина	2,0 g

- Другите съставки са: Динатриев едетат, розмариново масло, етаноламин, полиакрилова киселина (карбомер), пропиленгликол, изопропилов алкохол, пречистена вода.

Как изглежда Мобилат гел и какво съдържа опаковката

Мобилат гел се предлага в туби, съдържащи 50 g крем и 100 g крем. Мобилат гел представлява комбинация от три активни вещества, които след приложение върху кожата, облекчават възпалението, отока и болката.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Германия

Телефон: 0049 61016030

Факс: 0049 6101 603259



Производители:

Mobilat Produktions GmbH
Luitpoldstrasse 1
85276 Pfaffenhofen
Германия

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel
Германия

Дата на последно преразглеждане на листовката
Юни 2016

Допълнителна информация за пациента:

Защитното фолио върху отвора на тубата се пробива със заострения връх на обратната страна на капачката.



Всяка туба Мобилат гел се проверява за точно тегло. По време на процеса на пълнене на тубата, за да се осигури точното и правилното ѝ затваряне, във вътрешността ѝ се оставя малко празно място. Тази празнина не оказва влияние върху действителното тегло.

