

Листовка: информация за пациента

**Наклофен 11,6 mg/g гел
Диклофенак диетиламин**

**Naklofen 11.6 mg/g gel
Diclofenac diethylamine**

При болка и възпаление

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.
- Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Наклофен гел и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Наклофен гел
3. Как да използвате Наклофен гел
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Наклофен гел
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Наклофен гел и за какво се използва

Наклофен гел е лекарство за външно приложение с противовъзпалително и обезболяващо действие. Активното вещество диклофенак насища увреденото място, намалява възпалителния оток и подобрява подвижността.

Наклофен гел се използва за симптоматично облекчаване на болка и възпаление при:

- по-леки форми на ревматични заболявания (възпалителен, извънставен ревматизъм);
- други болезнени състояния (спортни травми и натъртвания на меките тъкани, разтягания, навяхвания и контузии, когато кожата не е повредена).

Отпуска се без лекарско предписание.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Наклофен гел**Не използвайте Наклофен гел**

- ако сте алергични към диклофенак или към някое от останалите съставки на това лекарство, изброени в точка 6;
- ако имате свръхчувствителност към други нестероидни противовъзпалителни лекарства (особено, ако сте имали задух, хрема или копривна треска след прием на салицилати или други нестероидни противовъзпалителни лекарствени продукти);
- ако сте бременна повече от 6 месеца.



Този лекарствен продукт не е предназначен за употреба при деца под 6 годишна възраст.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате Наклофен гел.

- Избягвайте прилагането върху големи участъци кожа за продължителен период от време, освен по лекарско предписание.
- Да не се прилага върху рани или открити наранявания.
- Избягвайте допира на гела до очите и лигавиците на устата и носа.
- Измийте ръцете си внимателно след употреба.
- Не правете слънчеви бани след намазване с Наклофен гел.
- Не приемайте това лекарство, то е само за мазане върху кожата!
- Да не се използват оклузивни превръзки.
- Да не се излага намазаната повърхност на директна слънчева светлина.

Други лекарства и Наклофен гел

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.

Необходимо е внимание при едновременна употреба на гела с други нестероидни противовъзпалителни лекарства.

Бременност, кърмене, фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Не прилагайте гелът върху гърдите, ако кърмите.

Шофиране и работа с машини

Наклофен гел не влияе върху способността да се шофира или работи с машини.

Наклофен гел съдържа пропилен гликол.

Пропилен гликол може да причини дразнене на кожата.

3. Как да използвате Наклофен гел

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Приложете 5 до 10 см лента от гела на болезненото място 3-4 пъти дневно и масажирайте с леки движения, докато той попие в кожата.

Лечението продължава за 2 до 4 седмици. Ако нямате облекчение на признаците на заболяването, обърнете се към лекар или фармацевт.

Наклофен гел може да се прилага едновременно, но с внимание, с други противовъзпалителни и обезболяващи лекарства приемани през устата.

Употреба при деца и юноши

Наклофен гел не се препоръчва за употреба при деца под 6 годишна възраст.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Наклофен гел

Ако сте използвали повече от лекарството, отколкото би трябвало, обърнете се към лекар или фармацевт за съвет.

Малко вероятно е гелът да се погълне, при това може да се проявят нежелани действия като гадене и повръщане.



4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство също може предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Много чести: могат да засегнат повече от 1 на 10 души

Чести: могат да засегнат до 1 на 10 души

Нечести могат да засегнат до 1 на 100 души

Редки: могат да засегнат до 1 на 1,000 души

Много редки: могат да засегнат до 1 на 10,000 души

С неизвестна честота: честотата не може да бъде определена от наличните данни

Чести: могат да засегнат до 1 на 10 души

- Обрив, възпаление на горния слой на кожата (екзема, дерматит, включително контактен дерматит), зачервяване на кожата (еритема), сърбеж на кожата.

Редки: могат да засегнат до 1 на 1,000 души

- Булозен дерматит (поява на мехури по кожата и лигавиците)

Много редки: могат да засегнат до 1 на 10,000 души

- Реакции на свръхчувствителност (бронхиална астма, реакции на свръхчувствителност с внезапно подуване на устните и лицето, врата, възможно е и на ръцете и стъпалата, или задушаване, или дрезгав глас-от оток на кръвоносните съдове). Ако това се случи, спрете прилагането на лекарството и незабавно потърсете лекарска помощ.
- Чувствителност към слънчева светлина (фоточувствителност).

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

5. Как да съхранявате Наклофен гел

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета след „Годен до”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.


Да се съхранява под 25°C.

Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Наклофен гел

- Активното вещество е диклофенак диетиламин (*diclofenac diethylamine*)
Всеки грам гел съдържа 11.6 mg диклофенак диетиламин.



- Помощни вещества: карбомер, макрогол 400, диетаноламин, изопропилов алкохол, пропилен гликол, безводен натриев сулфит, цетомакрогол 1000, децил олеинат, течен парафин, пречистена вода.

Как изглежда Наклофен гел и какво съдържа опаковката

Гелът е бял на цвят.

Наклофен е наличен в кутии от 60 g или 120 g гел в туба.

Притежател на разрешението за употреба и производител:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения

Дата на последно преразглеждане на листовката

