

## Листовка: информация за потребителя

нео-ангин без захар 1,20 mg/0,60 mg/5,72 mg таблетки за смучене  
2,4 - дихлоробензил алкохол/амилметакрезол/левоментол

neo-angin® sugar free 1,20 mg /0,60 mg /5,72 mg lozenges  
2,4 – dichlorobenzyl alcohol/amylnmetacresol/levomenthol

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

Винаги приемайте това лекарство, точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.
- Ако след 3-4 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

### Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява нео-ангин без захар и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете нео-ангин без захар
3. Как да приемате нео-ангин без захар
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате нео-ангин без захар
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

<b>ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА</b>	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. № 20000464	
Разрешение № 31545	06-11-2015
Одобрение № .....	

### 1. Какво представлява нео-ангин без захар и за какво се използва

За симптоматично лечение на леки инфекции в устната кухина, вкл. ларингити, фарингити, тонзилити, гингивити.

### 2. Какво трябва да знаете преди да приемете нео-ангин без захар

#### Не приемайте нео-ангин без захар

- Ако сте алергични (свръхчувствителни) към някое от активните вещества или към някоя от останалите съставки на нео-ангин без захар
- При деца под 6 годишна възраст

### Предупреждения и предпазни мерки

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него преди да вземете този продукт.



нео-ангин без захар не е подходящ за приложение при деца под 6 годишна възраст. Прилагането на лекарствения продукт при малки деца може да доведе до бронхоспазъм и гърчове.

#### **Други лекарства и нео-ангин без захар**

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително такива, отпускани без рецепта.

Не са известни взаимодействия с други лекарства при перорален прием.

#### **нео-ангин без захар с храни и напитки**

нео-ангин без захар може да се приема независимо от храненията.

#### **Бременност, кърмене и фертилитет**

Ако сте бременна или кърмите, се посъветвайте с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Няма клинични данни за влиянието на нео-ангин без захар по време на бременност и кърмене и затова този продукт трябва да се приема внимателно от бременни и кърмещи жени. Поради недостатъчна информация, не е възможно напълно да се изключи рискът за плода. Ето защо, ако сте бременна, моля консултирайте се с Вашия лекар преди приемането на този лекарствен продукт.

#### **Шофиране и работа с машини**

нео-ангин без захар не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

#### **Важна информация относно някои от съставките на нео-ангин без захар**

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него преди да вземете този продукт.

Този лекарствен продукт съдържа изомалт. Моля приемайте нео-ангин без захар само след консултация с лекар, в случай, че Ви е известно, че страдате от непоносимост към някои захари.

Една таблетка за смучене съдържа 2,6 g изомалт, съответващ на приблизително 0,13 хлебни единици.

Това трябва да се вземе предвид, ако спазвате диета за диабет. Калорийната стойност е 2,3 kcal/g изомалт. Изомалт може да има лек лаксативен ефект.

нео-ангин без захар съдържа оцветителя кохинил червено А (Е 124), който може да причини алергични реакции, включително астма. Тези реакции се срещат най-често при хора, които имат свръхчувствителност към ацетисалицилова киселина.

### **3. Как да приемате нео-ангин без захар**

Винаги приемайте нео-ангин без захар точно както е указано в тази листовка, или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако не Ви е предписано друго от Вашия лекар, спазвайте следните указания:



Възрастни и деца над 6 годишна възраст трябва да приемат по 1 таблетка за смучене на всеки 2-3 часа. Таблетката трябва да се остави да се разтвори бавно в устата. Максималната дневна доза е 6 таблетки за смучене.

#### **Продължителност на лечението**

Трябва да се свържете с Вашия лекар, ако симптомите Ви се влошат или не се подобрят след 3-4 дни.

#### **Ако сте приели повече от необходимата доза нео-ангин без захар**

Няма съобщения за случаи на предозиране.

#### **Ако сте пропуснали да приемете нео-ангин без захар**

Ако сте пропуснали да приемете или сте приели по-малка от необходимата доза нео-ангин без захар, продължете да вземате лекарството според указанията.

#### **Ако сте спрели употребата на нео-ангин без захар**

Няма опасност от възникване на никакви проблеми при спиране на употребата на нео-ангин без захар.

Ако имате никакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### **4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, нео-ангин без захар може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Оценката на нежеланите реакции се базира на следната честота

Много чести	Повече от 1 от 10 пациенти
Чести	По-малко от 1 от 10 пациенти, но повече от 1 от 100 пациенти
Нечести	По-малко от 1 от 100 пациенти, но повече от 1 от 1000 пациенти
Редки	По-малко от 1 от 1000 пациенти, но повече от 1 от 10000 пациенти
Много редки	По-малко от 1 от 10000 пациенти, включително индивидуалните случаи

Много редки: възпаление на лигавицата на устата и стомаха

Оцветителят кохинил червено А (Е 124) може да причини алергични реакции.

#### **Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите никакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата:

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +359 2 8903417

уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)



Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

## **5. Как да съхранявате нео-ангин без захар**

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте нео-ангин без захар след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява при температура под 30° C.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт, как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## **6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация**

### **Какво съдържа нео-ангин без захар**

- Активните вещества са: 2,4-дихлоробензил алкохол 1,20 mg, амилметакрезол 0,60 mg, левоментол 5,72 mg
- Другите съставки са: Масло от звездовиден анасон, масло от лютив мента, изомалт, винена киселина, кохинил червено А (E124 ).

### **Как изглежда нео-ангин без захар и какво съдържа опаковката**

Червени, кръгли полупрозрачни таблетки за смучене.

Оригинална опаковка – картонена кутия с 16 и 24 таблетки за смучене в блистери от PVC/PVdC и алуминиево фолио.

### **Притежател на разрешението за употреба и производител:**

Divapharma GmbH  
12274 Berlin  
Германия

### **Дата на последно одобрение на листовката**

Юни 2015

