

Листовка: информация за потребителя

Офталмо-Септонекс 0,2 mg/ ml +19 mg/ ml + 0,5 mg/ ml капки за очи, разтвор
Ophthalm-Septonex 0.2 mg/ ml +19 mg/ ml + 0.5 mg/ ml eye drops, solution

Карбетопендецинов бромид, борна киселина, боракс
(Carbaethopendecine bromide, Boric acid, borax)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.
- Ако след 5 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Офталмо-Септонекс и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Офталмо-Септонекс
3. Как да използвате Офталмо-Септонекс
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Офталмо-Септонекс
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	използва
Септонекс	9700498
Разрешение №	B6/MA/MP-42138
Издание №	09-08-2010

1. Какво представлява Офталмо-Септонекс и за какво се използва

Продуктът има антисептичен ефект (действа срещу патогенни микроорганизми) и е предназначен за накапване в окото за лечение на възпаления, които протичат без образуване на гной – т.е. когато не се налага използването на антибиотици.

Без консултация с лекар този лекарствен продукт се използва за лечение на остър и хроничен негноен конюнктивит, блефарит (възпаление на клепача) и някои локални възпаления на роговицата.

В случай на по-тежко възпаление, особено гнойни възпаления, се консултирайте със специалист по очни болести.

Препаратът може да се използва от възрастни, юноши и деца.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Офталмо-Септонекс

Не използвайте Офталмо-Септонекс:

- ако сте алергични към карбетопендецинов бромид, борна киселина, боракс или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
- ако страдате от сухо възпаление на роговицата (кератит) или конюнктивата.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, които се отпускат без рецепта.

Ако симптомите Ви се влошат или не получите ефект в рамките на пет дни, или се появят нежелани реакции, веднага се обадете на Вашия лекар.

Ако дете погълне Офталмо-Септонекс, веднага се обадете на лекар.



Други лекарства и Офталмо-Септонекс

При дългосрочно приложение, в клиничната практика не са наблюдавани взаимодействия.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Лекарството Офталмо-Септонекс не засяга дейностите (като управление на моторни превозни средства, работа с машини и работа на голяма височина), които изискват повишено внимание. Все пак, след приложението му може да се получи временно замъглено виждане и затова споменатите по-горе дейности, изискващи повишено внимание трябва да се извършват само след изчезването на този временен ефект.

3. Как да използвате Офталмо-Септонекс

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Ако не Ви е препоръчано друго, при остри възпаления накапвайте по 1 капка на всеки един или два часа в конюнктивалното пространство, а при хронични възпаления 1 капка веднъж до три пъти дневно.

Продължителността на лечение не трябва да надвишава 10 дни.

Как да прилагате Офталмо-Септонекс: Поставете палеца на лявата ръка върху долния клепач и внимателно го дръпнете надолу, наведете главата си назад и погледнете нагоре, докато поставяте една капка в окото.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Офталмо-Септонекс

Ако този продукт се използва правилно, не съществува вероятност от предозиране. Все пак, ако се погълне е възможно да се появят следните проблеми: чревни нарушения, диария, повръщане, коремна болка, кожно възпаление, лесна възбудимост, треперене, главоболие, мускулни спазми, депресия, кома, нарушена функция на бъбреците или черния дроб.

Ако го погълнете, незабавно се консултирайте с Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да използвате Офталмо-Септонекс

Не прилагайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

При чувствителни пациенти може да се наблюдава зачервяване и възпаление на конюнктивата. Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дондуков Груев“ № 8, 1303 София, тел.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.



5. Как да съхранявате Офталмо-Септонекс

Да се съхранява под 25°C. Да се съхранява в оригиналната опаковка. Да не се охлажда или замразява.

Не използвайте капките за очи повече от 28 дни след отваряне на бутилката.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарства, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Офталмо-Септонекс

- Активните вещества са: 2 mg карбетопендецинов бромид, 190 mg борна киселина и 5 mg боракс в 10 ml разтвор .
- Другите съставки са: динатриев едетат, вода за инжекции.

Как изглежда Офталмо-Септонекс и какво съдържа опаковката

Капки за очи, разтвор

Бистър, безцветен разтвор

Размер на опаковката: 10 ml.

Притежател на разрешението за употреба

Teva B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem

Нидерландия

Производител

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Str. 3

89143 Blaubeuren

Германия

Дата на последно преразглеждане на листовката –

