

Листовка: информация за потребителя

22120572

Б6/М/Мб-46138

20 -06- 2019

ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос, разтвор
Ксилометазолинов хидрохлорид

OTRIVIN MENTHOL 0.1% Nasal spray, solution
Xylometazoline hydrochloride

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както ви е казал вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашия фармацевт.
- Ако получите никакви нежелани лекарствени реакции, уведомете вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява **ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос** и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате **ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос**
3. Как да използвате **ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос**
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате **ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос**
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос и за какво се използва

ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос е назален деконгестант, който бързо отпушва запушения нос. Той съдържа охлаждащите етерични масла ментол и евкалиптол като допълнение към назалния деконгестант. Предназначен е за лечение на възрастни и юноши над 12 години.

ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос съдържа активното вещество ксилометазолин. Той бързо отпушва запушения ви нос и спомага отстраняването на блокирания лигавицата секрет, като ви дава възможност да дишате по-лесно. **ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос** се използва за облекчаване запушването на носа, причинено от простудни заболявания, сенна хрема или други алергични ринити, синузити.

Ефектът на **ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос** започва в рамките на 2 минути и продължава до 12 часа. Той се понася добре дори от пациенти с чувствителна носна лигавица.

ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос, приложен в носа, може да се използва и при възпаление на ухото, за да подпомогне отбъбването на назофарингеалната лигавица, покриваща носните пътища и гърлото.

ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос може да ви бъде предписан от вашия лекар, ако ви предстои изследване на носната кухина.

Лабораторни изследвания показват, че ксилометазолинът намалява активността на **аденовирус**, усложняващ простудните заболявания.

ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос не съдържа никакви консерванти, което намалява до минимум риска от алергии и дразнене.



2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос

Не използвайте ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос:

- Ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество ксилометазолинов хидрохлорид или към някоя от останалите съставки на това лекарство, посочени в края на тази листовка (вижте точка 6);
- Ако скоро са ви правили операция през носа (мозъчна хирургия, при която операцията се извършила през носа или устата);
- Ако имате закритоъгълна глаукома (повишено вътреочно налягане);
- Ако имате хронична носна инфекция с много сухи носни проходи (сух или атрофичен ринит).

Ако е налице някое от изброените, моля информирайте вашия лекар или фармацевт, защото ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос не е подходящ за вас при тези обстоятелства.

Предупреждения и предпазни мерки

Консултирайте се с вашия лекар или фармацевт преди използването на ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос, ако имате някое от следните заболявания:

- високо кръвно налягане;
- заболяване на сърдечно-съдовата система (например синдром на удължен QT интервал);
- хиперфункция на щитовидната жлеза (хипертиреоидизъм);
- диабет;
- увеличена простатна жлеза (простатна хипертрофия);
- доброкачествен тумор на надбъбречните жлези, който произвежда големи количества адреналин и норадреналин (феохромоцитом);
- лекувате се с антидепресанти -monoаминооксидазни инхибитори (МАОИ) или сте ги приемали през последните две седмици.

Ако е налице някое от изброените заболявания, не употребявайте ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос, преди да се консултирате с вашия лекар или фармацевт.

Подобно на другите лекарства за отпушване на носа (назални деконгестанти), ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос може да предизвика смущения в съня, замаяност и треперене при много чувствителни пациенти. Консултирайте се с вашия лекар, ако някой от симптомите стане обезпокоителен.

Подобно на другите назални деконгестанти, ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос не трябва да се използва повече от 10 последователни дни. Консултирайте се с вашия лекар, ако симптомите продължават. Продължителната или прекомерната употреба на продукта може да доведе до повторно запушване на носа или влошаване.

ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос не е предназначен за използване в очите или устата. Не надвишавайте препоръчелната доза, особено при деца и пациенти в старческа възраст.

Деца

ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос не се препоръчва да се използва от деца под 12 години.

Други лекарства и ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос

Информирайте вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Не трябва да използвате ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос, особено ако приемате някои медикаменти за лечение на депресия. Такива лекарства са:

- Мономаминооксидазни инхибитори (МАОИ): НЕ използвайте ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос, ако приемате или сте приемали МАОИ през последните 14 дни;
- Трициклични и тетрациклични антидепресанти.

Консултирайте се с вашия лекар, ако приемате някои от изброените по-горе лекарства, преди употребата на ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос.



Бременност, кърмене и фертилитет

ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос не трябва да се използва по време на бременност.

Ако кърмите, **ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос** трябва да бъде употребяван само ако това ви е препоръчано от вашия лекар.

Посъветвайте се с вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

3. Как да използвате ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос

Винаги използвайте **ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос** точно както е описано в тази листовка или както ви е казал вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте вашия лекар или фармацевт.


ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос не се препоръчва да се използва от деца под 12-годишна възраст.

Препоръчителната доза е, както следва:

ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос


Концентрация	Възраст	Приложение
ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос	Възрастни и юноши над 12 години	1 впърскване във всяка ноздра до 3 пъти дневно при нужда. Не превишавайте максимума от 3 впърсквания дневно във всяка ноздра. Последната доза може да се приложи преди лягане.

- Не режете накрайника. Дозирацият спрей е готов, за да бъде зареден преди първоначалната употреба.



- Издухайте си носа.
- Отстранете предпазната капачка.
- Преди да използвате за пръв път **ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос** заредете помпата, извършвайки четири напомпвания до появата на спрей във въздуха. При следваща употреба помпата ще бъде готова за употреба. Ако спреят не се разпърсне по време на първоначалното активиране или не е бил използван в продължение на повече от 6 дни, ще трябва да я заредите отново, чрез четири напомпвания. Бъдете много внимателни да не пръснете в очите или устата.
- Дръжте изправена бутилката, като поставите палеца в основата и, а накрайника между пръстите.





- Наклонете се леко напред и поставете накрайника в ноздрата.
- Натиснете и едновременно с това вдишайте леко през носа.



- Повторете процедурата и за другата ноздра.
- Почистете и подсушете накрайника, преди да поставите предпазната капачка непосредствено след употреба.
- За да се избегне възможно разпространение на инфекцията, **ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос** трябва да се употребява само от един пациент.

Ако сте използвали повече от необходимата доза ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос
Ако случайно сте приели твърде голямо количество **ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос** или
в случай на поглъщане, незабавно се свържете с вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да използвате ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, **ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос** може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

СПРЕТЕ употребата на **ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос** и незабавно потърсете лекарска помощ, ако установите някои от следващите симптоми, които могат да са проява на алергична реакция:

- затруднено дишане или преглъщане;
- подуване на лицето, устните, езика или гърлото;
- силен сърбеж на кожата с червен обрив или изразен оток.

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 человека).

Сухота или дразнене на носната лигавица, гадене, главоболие, чувство на парене на мястото на прилагане.

Много редки нежелани реакции (могат да засегнат по-малко от 1 на всеки 10 000 человека).

Алергични реакции (кожен обрив, сърбеж), замъглено виддане, нарушен или учестен сърден ритъм.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да



съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване (вижте детайлите по-долу). Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

България

Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. „Дамян Груев“ № 8
1303 София
Тел.: +359 2 8903417
Уебсайт: www.bda.bg

5. Как да съхранявате ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте **ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос** след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и бутилката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в оригиналната опаковка. Да се съхранява под 25°C.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте вашия фармацевт как да изхвърлят лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос

Активното вещество на **ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос** е ксилометазолинов хидрохлорид. Всеки ml съдържа 1 mg ксилометазолинов хидрохлорид.

Другите съставки са: натриев дихидрогенфосфат дихидрат, динатриев фосфат додекахидрат, натриев хлорид, динатриев едетат, левоментол, цинеол, сорбитол, макроголглицеролов хидроксистеарат (Cremorphor RH 40), пречистена вода.

Как изглежда ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос и какво съдържа опаковката
ОТРИВИН МЕНТОЛ 0,1% Спрей за нос е назален дозиращ спрей, съдържащ опалесциращ бял разтвор с аромат на мента и евкалипт в бутилка с помпа, доставяща точно количество от продукта. Съдържанието на опаковката е 10 ml.

Не всички опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:

GlaxoSmithKline Dungarvan Limited, Knockbrack, Dungarvan, Co. Waterford, Ирландия

Производител:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstrasse 4, 80339 München, Германия

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, тел. 02/953-10-34

Дата на последно преразглеждане на листовката



февруари 2019

Търговски марки, притежавани или лицензиирани от групата компании GSK.
©2019 Групата компании GSK или тяхен лицензодател.

