

Листовка: информация за пациента

Пантогел 5% гел Pantogel 5% gel

декспантенол (dexpanthenol)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Пантогел и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Пантогел
3. Как да използвате Пантогел
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Пантогел
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20020476
Разрешение №	33677, 10-06-2015
Одобрение №	/

1. Какво представлява Пантогел и за какво се използва

Пантогел е лекарствен продукт, съдържащ лекарственото вещество декспантенол, който като производно на пантотеновата киселина принадлежи към голямата група на витамин В. При попадането си в клетките декспантенол бързо се метаболизира до пантотенова киселина, която играе особено важна роля за растежа и регенерацията на кожата и лигавиците. При недостиг в организма се появяват смущения в растежа, кожни заболявания, язви на лигавиците, потиска се образуването на антитела. При външно приложение, декспантенолът може да задоволи повишената потребност на увредената кожа от пантотенова киселина.

Пантогел гел се използва за лечение на:

- иритативни дерматити (раздразнена кожа);
- повърхностни изгаряния;
- еритем след излагане на ултравиолетови лъчи (слънчево изгаряне);
- за подобряване възстановяването на бавно заздравяващи рани и декубитуси;
- за лечение на повърхностни наранявания на кожата на млечната жлеза, включително на гърдните зърна при кърмачки.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Пантогел

Не приемайте Пантогел:

- ако сте алергични към декспантенол или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Пантогел.

Пантогел гел е предназначен само за приложение върху кожата т.е. за локална (външна) употреба. Не бива да се допуска поглъщане на гела или приложение върху очите и лигавиците.



Други лекарства и Пантогел

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.

Не са известни случаи на неблагоприятни лекарствени взаимодействия с други лекарства.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Няма риск от прилагането на Пантогел гел по време на бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини

Продуктът не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

Пантогел съдържа парабени

Този лекарствен продукт съдържа като помощни вещества метил парахидроксибензоат и пропил парахидроксибензоат, поради което може да причини някои алергични реакции (контактен дерматит и рядко уртикария и бронхоспазъм).

3. Как да използвате Пантогел

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Този продукт се отпуска без лекарско предписание.

Прилага се локално върху кожата.

Пантогел гел се нанася чрез леко втриване на тънък слой от 1 до 3 пъти дневно.

В периода на кърмене лекарството се намазва върху гърдните зърна след всяко кърмене, без опасност за кърмачето.

Ако имате впечатлението, че ефектът от приложението на Пантогел е по-силен от очаквания или недостатъчен, обърнете се към своя лекар или фармацевт.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Пантогел:

Не е възможно предозиране при спазване на препоръчания дозов режим и начин на употреба.

При инцидентно поглъщане:

При поглъщане на големи количества от Пантогел гел не може да се очаква интоксикация.

Евентуално появили се стомашно-чревни оплаквания се лекуват симптоматично.

При прояви на симптоми на предозиране, незабавно се обърнете към лекар.

Ако сте пропуснали да използвате Пантогел

Ако сте пропуснали едно приложение, приложете продукта максимално рано след пропуснатия час.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Много рядко е възможна поява на алергични кожни реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да



съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: 02 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Пантогел

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 25°C. Да не се замразява.

Срок на годност след първо отваряне на опаковката: 3 (три) месеца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

- Активното вещество е декспантенол. 1 g гел съдържа 50 mg декспантенол.
- Помощни вещества: карбомер, троламин, пропиленгликол, динатриев едетат, левоментол, захарин натрий, метил парахидроксибензоат, пропилен парахидроксибензоат, етанол, пречистена вода.

Как изглежда Пантогел и какво съдържа опаковката

Пантогел се предлага в алуминиеви туби от 40 g и 60 g, поставени в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба

Актавис ЕАД
ул. "Атанас Дуков" № 29
1407 София, България

Производител

Балканфарма-Троян АД,
ул. "Крайречна" № 1
5600 Троян, България

Дата на последно преразглеждане на листовката 03/2016

