

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА

Листовка - Приложение 2

Към Рег. № 2014.0.362

№ 25-07-2019

Викс АнтиГрип Макс 1 000 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор
Vicks AntiGrip Max 1 000 mg/12,2 mg powder for oral solutionпарацетамол/фенилефринов хидрохлорид
(paracetamol/phenylephrine hydrochloride)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 5 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Викс АнтиГрип Макс и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Викс АнтиГрип Макс
3. Как да приемате Викс АнтиГрип Макс
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Викс АнтиГрип Макс
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Викс АнтиГрип Макс и за какво се използва

Викс АнтиГрип Макс е предназначен за облекчаване на симптоми на настинка и грип като главоболие, болки, възпалено гърло, запушване на носа и за понижаване на температурата. Той съдържа две активни съставки:

- парацетамол е добре известно болкоуспокояващо средство (аналгетик) и може също да понижи повишената температура (антипиретик);
- фенилефринов хидрохлорид (назален деконгестант) намалява отока в ноздрите и така облекчава състоянието при запушване на носа.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Викс АнтиГрип Макс**Не приемайте Викс АнтиГрип Макс:**

- ако сте алергични към парацетамол, фенилефрин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
- ако имате сериозно сърдечно заболяване;
- ако имате високо кръвно налягане (хипертония);
- ако имате тежко чернодробно заболяване;
- ако имате бъбречно заболяване или проблеми с бъбреците;
- ако имате изразена свръхактивност на щитовидната жлеза (хипертиреозидизъм);
- ако имате глаукома (повишено вътреочно налягане от тесногълен тип);
- ако понастоящем приемате моноаминоксидазни инхибитори (MAOI) или сте ги приемали през последните две седмици;
- ако приемате други деконгестанти за настинка и грип.



Важно: съдържа парацетамол. Да не се приема едновременно с други продукти, които съдържат парацетамол.

Незабавно трябва да се търси медицинска помощ в случай на предозиране, дори и когато се чувствате добре, поради риска от забавено, сериозно чернодробно увреждане.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди да приемете Викс АнтиГрип Макс:

- ако имате проблем с чернодробната функция;
- ако имате изразена свръхактивност на щитовидната жлеза (хипертиреозидизъм);
- ако сте мъж и имате увеличена простатна жлеза, тъй като може да е по-трудно да уринирате;
- ако сте диабетик или имате проблем с кръвообращението (включително синдром на Рейно);
- ако страдате от недोхранване (ако сте значително под нормалното тегло);
- ако страдате от глюкозо-6-фосфат дехидрогеназна недостатъчност (генетично нарушение);
- ако имате феохромоцитом;
- ако имате астма, чувствителна към аспирин, тъй като може да имате свръхчувствителност към парацетамол;
- ако сте бременна или кърмите.

Деца и юноши

Да не се дава на деца под 16-годишна възраст.

Други лекарства и Викс АнтиГрип Макс

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемете, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства. Уведомете Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Викс АнтиГрип Макс, ако приемате:

- лекарства, съдържащи парацетамол или други деконгестанти за настинка и грип. Ако приемате такива, не приемайте Викс АнтиГрип Макс.
- моноаминоксидазни инхибитори (МАОИ), използвани за лечение на депресия или болестта на Паркинсон. Не приемайте Викс АнтиГрип Макс, ако сте приемали МАОИ през последните 14 дни.
- трициклични антидепресанти за лечение на депресия, като амитриптилин или имипрамин;
- лекарство за понижаване на високо кръвно налягане (антихипертензивен продукт), включително бета-блокери, или за подобряване на сърдечната функция или коригиране на абнормен сърдечен ритъм (дигоксин, ланоксин, дигитоксин);
- лекарство против гадене и повръщане (като метоклопрамид или домперидон);
- лекарства за разреждане на кръвта (антикоагуланти), като варфарин или други кумарини;
- лекарство за намаляване на висок холестерол (като колестирамин);
- седативи (барбитурати);
- продукти, съдържащи ацетилсалицилова киселина (аспирин);
- хлорамфеникол (антибиотик);
- пробенецид или AZT (зидовудин).

Викс АнтиГрип Макс с храна и напитки

Не приемайте този продукт с алкохолни напитки.

Бременност, кърмене и фертилитет

Прием на Викс АнтиГрип Макс по време на бременност или кърмене не се препоръчва. Трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт преди употреба.

Викс АнтиГрип Макс съдържа аспартам (E951), който е източник на фенилаланин. Може да бъде вреден за хора с фенилкетонурия.



Викс АнтиГрип Макс съдържа захароза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, консултирайте се с него преди да приемате този лекарствен продукт.

3. Как да приемате Викс АнтиГрип Макс

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Препоръчителната доза е:

Възрастни: 1 саше на всеки 4-6 часа, ако се налага.

Юноши (на възраст на и над 16 години): 1 саше на всеки 6 часа при необходимост.

Да не се приемат повече от 4 сашета за всеки 24-часов период.

Да не се надвишава препоръчителната доза.

Употреба при деца и юноши

Да не се дава на деца под 16 години, освен ако не е предписано от лекар.

Начин на приложение

Това лекарство е прах, който трябва да се разтвори във вода и да се приеме като топла напитка. Изсипете едно саше в чаша със стандартен размер. Напълнете с топла, но не вряща вода (около 250 ml). Оставете да изстине до температура, подходяща за пиене.

Продължителност на лечението

Ако след 5 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Ако сте приели повече от необходимата доза Викс АнтиГрип Макс

Незабавно потърсете медицинска помощ, ако по невнимание приемете повече отколкото трябва, дори ако се чувствате добре, поради риска от забавено, сериозно чернодробно увреждане.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Ако получите някоя от следните нежелани реакции, или се случи нещо необичайно, незабавно прекратете приема на това лекарство.

Много чести: могат да засегнат повече от 1 на 10 души

Чести: могат да засегнат до 1 на 10 души

Нечести: могат да засегнат до 1 на 100 души

Редки: могат да засегнат до 1 на 1 000 души

Много редки: могат да засегнат до 1 на 10 000 души

С неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка

В редки случаи фенилефрин може да причини ускорен сърдечен ритъм (палпитации). Рядко могат също да се наблюдават високо кръвно налягане с главоболие, повръщане и палпитации.



Фенилефрин може в редки случаи да причини и нарушения на съня (безсъние), нервност, треперене (тремор), тревожност, безпокойство, обърканост, раздразнителност, главоболие или замаяност.

Загуба на апетит, гадене или повръщане са чести при фенилефрин.

При парацетамол има съобщения за нарушения на определени кръвни клетки, но това е много рядко. Ако се случи това, симптомите може да включват необичайна поява на синини или инфекции като възпалено гърло.

Съобщава се за алергични реакции (като кожен обрив или уртики) и много редки случаи на тежки кожни реакции. Тежки алергични реакции (анафилаксия), хрипове или затруднено дишане може да се наблюдават рядко.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Викс АнтиГрип Макс

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не приемайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху сашето или картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява под 25°C.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Викс АнтиГрип Макс

- Активните вещества са парацетамол и фенилефринов хидрохлорид. Едно саше съдържа 1000 mg парацетамол и 12,2 mg фенилефринов хидрохлорид (еквивалентен на 10 mg фенилефрин).
- Другите съставки са захароза, натриев цитрат, лимонена киселина, аскорбинова киселина, калиев ацесулфам (E950), аспартам (E951), хинолиново жълто (E104), лимонени аромати (лимонено масло, цитрал, цитронелол, линалоол, цитрон, малтодекстрин, захароза, модифицирано нишесте, акация, бутил хидроксианизол, триацетин, токоферол), лимонен сок (цитрал, малтодекстрин, модифицирано нишесте, силициев диоксид).

Как изглежда Викс АнтиГрип Макс и какво съдържа опаковката

Викс АнтиГрип Макс е жълт прах за перорален разтвор, който е опакован в ламинирани сашета, поставени в картонена опаковка. Продуктът се предлага в картонени опаковки с 5 и 10 сашета.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.



За допълнителна информация относно този продукт, моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт, или се свържете с притежателя на разрешението за употреба.

Притежател на разрешението за употреба

Wick Pharma, Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH,
Sulzbacher Strasse 40,
65824 Schwalbach am Taunus,
Германия

Производител

Wrafton Laboratories Limited
Braunton,
Devon,
EX33 2DL
Обединено Кралство

или

Procter & Gamble Manufacturing GmbH
Procter & Gamble Strasse 1
64521 Gross-Gerau, Hessen
Германия

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в държавите членки на ЕИП под следните имена:

България: Викс АнтиГрип Макс 1 000 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор

Чешка Република: Vicks SymptoMed Forte citrón

Естония: Dioppex

Унгария: SymptoMed Wick Citrom ízű por belsőleges oldathoz

Литва: Dioppex 1000mg/12,2mg milteliai geriamajam tirpalui

Латвия: Dioppex 1000 mg/12.2 mg pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai

Румъния: Vicks AntiGrip Max

Ирландия: Paracetamol 1000mg, Phenylephrine HCl 12.2mg Powder for Oral solution, lemon flavour

Обединено кралство: Vicks Cold and Flu Max Strength Hot Drink Lemon

Дата на последно преразглеждане на листовката 03/2019

