

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

ГАСТРОКИНД таблетки
GASTROKIND tablets

БЪЛГАРСКА Агенция по лекарства	
Приложение 1 към характеристика на продукта - Приложение 1	
Лот. №	20060659
Издавател №	35753 / 05-12-2016

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

1 таблетка (100 mg) съдържа:

Активни вещества:

Арсеникум албум (Arsenicum album) D6	20,00 mg
Кротон тиглиум (Croton tiglium) D6	20,00 mg
Окубака (Okoubaka) D4	20,00 mg
Вератрум албум (Veratrum album) D12	20,00 mg

Помощни вещества с известно действие: лактозаmonoхидрат (използвана като носител на хомеопатичната тритурация)

За пълния списък на помощните вещества вижте т. 6.1

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Таблетка. Бяла до почти бяла, двойно плоска таблетка със скосени ръбове.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Стомашно-чревни функционални нарушения при малки деца, като гадене, повръщане, диария и стомашна болка. Тези оплаквания може да са в резултат на промяна в храненето като:

- преминаване от майчина кърма към адаптирано мляко за кърмачета,
- стартиране на приема на твърди храни (напр. зеленчуци, плодове, месо),
- адаптиране към храната в детските ясли и градини,
- консумация на непознати храни при пътуване

4.2 Дозировка и начин на приложение

Дозировка:

Деца на възраст от 1 до 6 години:

При остри оплаквания се приемат по 1 таблетка на всеки час, до максимум 6 таблетки на ден.
След отшумяване на оплакванията се приемат по 1 таблетка 4 пъти на ден.

Начин на приложение:



Таблетките трябва да се оставят да се разтопят бавно в устата. Ако е необходимо, таблетките могат да се разтворят в малко вода.

Необходимо е да се спазва интервал поне от половин час между хранене и прием на лекарството.

4.3 Противопоказания

Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества, изброени в т. 6.1.

Да не се прилага при деца под 1 годишна възраст.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Преоценка на лечението е необходима:

- ако в рамките на 3 дни детето не се повлиява достатъчно от приема на ГАСТРОКИНД,
- ако оплакванията се появяват често,
- при появя на допълнителни оплаквания.

ГАСТРОКИНД съдържа лактоза, която е използвана като носител при хомеопатичната тритурация. Пациентите с вродена непоносимост към галактоза, Lapp-лактазна недостатъчност или глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция не трябва да приемат този лекарствен продукт.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са наблюдавани взаимодействия с други лекарствени продукти. Употребата на този хомеопатичен лекарствен продукт не изключва възможността за прием на други лекарствени продукти.

Родителите биват съветвани да се консултират с лекар, ако детето им приема, доскоро е приемало или е възможно да приема други лекарствени продукти.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Този лекарствен продукт е предназначен за деца.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Този лекарствен продукт е предназначен за деца.

4.8 Нежелани лекарствени реакции


До момента не са известни нежелани лекарствени реакции.

Ако някакви нежелани реакции бъдат забелязани, е необходимо да се предприемат подходящи мерки.

Забележка: При употреба на хомеопатични лекарства съществуващите оплаквания могат да се влошат временно (начално хомеопатично влошаване). В тези случаи пациентите биват съветвани да прекратят лечението и да се консултират с лекар.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полз/рисък за БЛГКА



лекарстваия продукт. От медицинските специалисти се изискава да съобщават всяка подозираниа нежелана реакция чрез Изпълнителна агенция по лекарствата:
ул. „Дамян Груев“ № 8
1303 София
Тел.: +35 928903417
Уебсайт: www.bda.bg

4.9 Предозиране

Не са докладвани случаи на предозиране.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

Фармакотерапевтична група: Хомеопатичен лекарствен продукт

Хомеопатичната терапия се различава значително от конвенционалната медицина по отношение на разбирането за заболяванията и използването на лечебните вещества. Хомеопатичните средства стимулират механизите за собствена защита на организма и по този начин активират самолечителните сили. Отговорът на организма на хомеопатичните действия е строго индивидуален. Поради тези причини дозо-специфични фармакологични ефекти, фармакокинетични и фармакодинамични данни не могат да бъдат определени.

5.1. Фармакодинамични свойства

Неприложимо

5.2. Фармакокинетични свойства

Неприложимо

5.3. Предклинични данни за безопасност

Неприложимо. ГАСТРОКИНД, като хомеопатичен лекарствен продукт не е преминал през предклинични проучвания.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Целулоза, микрокристална
Талк
Магнезиев стеарат

6.2 Несъвместимости

Неприложимо

6.3 Срок на годност

5 години

6.4 Специални условия на съхранение



Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

6.5 Вид и съдържание на опаковката

Бутилка от кафяво стъкло, с пластмасова капачка, съдържаща 150 таблетки.

6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне

Няма специални изисквания

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe
Германия

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

20060649

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

16/11/2006

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

11/2016

