

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Никорет Фрешминт 1 mg/впръскване, спрей за устна лигавица, разтвор
Nicorette Freshmint 1 mg/spray, oromucosal spray, solution

ПОДЪЛГИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Кратка характеристика на продукта - Приложение 1

Ref. №:	2020479
БГ/МА/176-44/35	-6
УА1-0407/04-01-2019	

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Едно впръскване осигурява 1 mg никотин (*nicotine*) в 0,07 ml разтвор.
1 ml разтвор съдържа 13,6 mg никотин (*nicotine*).

Помощно вещество с известен ефект:

Етанол 7,1 mg/впръскване

Пропилен гликол 11 mg/впръскване

Бутилиран хидрокситолуен 363 ng/впръскване

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Спрей за устна лигавица, разтвор.

Бистър до слабо опалесцентен, безцветен до бледожълт разтвор.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Никорет Фрешминт спрей за устна лигавица се използва за лечение на тютюнева зависимост при възрастни като облекчава симптомите на отнемане, включително никотиновия глад по време на опита за отказване. Еventуалната цел е спиране на пушенето за постоянно. Препоръчително е Никорет Фрешминт спрей за устна лигавица да бъде използван с поведенческа подкрепяща програма.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Лицата трябва да спрат пушенето напълно по време на курса на лечение с Никорет Фрешминт спрей за устна лигавица.

Възрастни и лица в старческа възраст

Следната таблица показва препоръчваната схема за употреба на спрея за устна лигавица по време на пълно лечение (Стъпка I) и по време на постепенното намаление на дозата (Стъпка I и Стъпка III). Може да се използват до 4 впръсквания на час. Да не се надвишават 2 впръсквания за дозиращ епизод и да не се надвишават 64 впръсквания (4 впръсквания на час за 16 часа) за 24-часов период.



Стъпка I: Седмици 1-6

Прилагат се 1 или 2 впръсквания, когато обикновено биха се пушили цигари или когато се появи желание за пущене. Ако след еднократно впръскване, никотиновият глад не се контролира до няколко минути, трябва да се приложи второ впръскване. Ако са необходими 2 впръсквания, бъдещите дози може да се доставят като 2 последователни впръсквания.

Повечето пушачи ще имат нужда от 1-2 впръсквания през 30 минути до 1 час.

Стъпка II: Седмици 7-9

Започва се намаляване на броя на впръскванията на ден. Към края на седмица 9 лицата трябва да прилагат ПОЛОВИНАТА от средния брой впръсквания на ден, използвани в Стъпка I.

Стъпка III: Седмици 10-12

Продължава се намаляването на броя на впръскванията на ден, така че лицата не използват повече от 4 впръсквания на ден през седмица 12. Когато се стигне до 2-4 впръсквания на ден, употребата на спрея за устна лигавица трябва да се преустанови.

Пример: Ако обикновено се изпушват средно 15 цигари на ден, през деня трябва да се използват 1-2 впръсквания поне 15 пъти.

За да си помогнат да не пушат след Стъпка III, лицата може да продължат да прилагат спрея за устна лигавица в ситуации, когато силно се изкушават да пушат. При желание за пущене може да се използва едно впръскване, като може да се приложи второ впръскване, ако първото не помогне до няколко минути. През този период не трябва да се използват повече от четири впръсквания на ден. Обикновено не се препоръчва редовна употреба на спрея за устна лигавица повече от 6 месеца. Някои бивши пушачи може да се нуждаят от по-продължително лечение със спрей за устна лигавица, за да не подновят пущенето. Трябва да се запази оставащото количество спрей за устна лигавица, за да се използва при внезапно желание за пущене.

Педиатрична популация

Да не се прилага Никорет Фрешминт спрей за устна лигавица при лица под 18-годишна възраст. Няма опит с лечението на юноши на възраст под 18 години с Никорет Фрешминт спрей за устна лигавица.

Метод на прилагане

След зареждане накрайникът на спрея се насочва възможно най-близо до устата. Натиска се пътно горната част на диспенсера и се изпърска една доза от спрея в устата, избягвайки устните. Не трябва да се вдишва докато се впръска в устата, за да се избегне попадането на спрея в дихателните пътища. За най-добри резултати – след впръскване да не се прегъльща за няколко секунди.

Лицата не трябва да ядат или пият по време на прилагане на спрея за устна лигавица.

Съвет и поддръжка обикновено увеличават успеха.

4.3 Противопоказания

- Свръхчувствителност към никотин или към някое от помощните вещества, описани в точка 6.1.
- Деца под 18 години.
- Лица, които никога не са пушили.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Никорет Фрешминт спрей за устна лигавица не трябва да се използва от непушачи.

Ползите от отказването от тютюнопушене надхвърлят всички рискове, свързани с правилно приложената никотинова заместителна терапия (НЗТ).



Подходящ медицински специалист трябва да направи оценка на съотношението полза-риск при пациенти със следните състояния:

- **Сърдечно-съдови заболявания:** Зависими пушачи със скорошен миокарден инфаркт, нестабилна или влошаваща се стенокардия, включително ангина на Prinzmetal, тежки сърдечни аритмии, скорошен мозъчно-съдов инцидент и/или тези, които страдат от неконтролирана хипертония трябва да се настърчават да спрат пушенето с нефармакологични средства (напр. с лични консултации). Ако това не успее, може да се има предвид спреят за устна лигавица, но тъй като данните относно безопасността на тази група пациенти са ограничени, прилагането трябва да се започне само под стриктно лекарско наблюдение.
- **Захарен диабет.** Пациенти със захарен диабет трябва да се съветват да проследяват нивата на кръвната си захар по-стриктно от обикновено, когато се спре пушенето и се започне НЗТ, тъй като намалението на никотина индуцира освобождаване на катехоламини, което може да повлияе метаболизма на въглехидратите.
- **Алергични реакции:** Предразположение към ангиоедем и уртикария.
- **Бъбречно и чернодробно увреждане:** Да се употребява предпазливо при пациенти с умерено до тежко чернодробно увреждане и/или тежко бъбречно увреждане, тъй като клирънсът на никотина или неговите метаболити може да бъде намален при евентуално увеличени нежелани ефекти.
- **Феохромоцитом и неконтролиран хипертиреоидизъм:** Да се прилага предпазливо при пациенти с неконтролиран хипертиреоидизъм или феохромоцитом, тъй като никотинът предизвика освобождаване на катехоламини.
- **Стомашно-чревно заболяване:** Никотин може да обостри симптомите при пациенти, страдащи от езофагит, стомашна или пептична язва, като препарати за НЗТ трябва да се използват внимателно при тези състояния.

Опасност при деца:

Дозите никотин, понасящи се от пушачи, при деца може да предизвикат тежка токсичност, която може да бъде фатална. Продукти, съдържащи никотин, не трябва да се оставят на места, където може да се пипат или погълнат от деца (виж точка 4.9 Предозиране).

Пренесена зависимост: Може да възникне пренесена зависимост, но тя е по-малко вредна и по-лесна за преодоляване от зависимостта при тютюнопушене.

Прекратяване на пушенето: Полицикличните ароматни въглеводороди в тютюневия дим индуцират метаболизма на лекарства, метаболизирани от CYP1A2 (и вероятно от CYP1A1). Когато пушач спре пушенето, това може да доведе до забавяне на метаболизма и последващо повишение на кръвните нива на такива лекарства. Това има евентуално клинично значение при продукти с тесен терапевтичен прозорец, напр. теофилин, такрин, клозапин и ролинирол. Плазмените концентрации на други лекарствени продукти, които се метаболизират отчасти от CYP1A2, например имипрамин, оланзапин, кломипрамин и флуоксамин могат да благоприятстват прекратяването на пушенето, въпреки че такива данни липсват и възможното клинично значение на този ефект при тези лекарствени продукти е неизвестен. Ограничени данни сочат, че метаболизъмът на флексанид и пентазоцин може да бъде индуциран от пушене.

Помощни вещества: Спреят за устна лигавица съдържа малки количества етанол (алкохол), по-малко от 100 mg на доза (1 или 2 впръсквания). Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на впръскване, т.е. по същество "без натрий". Това лекарство съдържа 1 mg пропиленгликол във всяко впръскване, което е еквивалентно на 150 mg/ml. Често съществува налиčие на бутилиран хидрокситолуен. Никорет Фрешминт може да причини лекални/кожни реакции (например контактен дерматит) или дразнене на очите и лигавиците.

Когато се прилага спреят за устна лигавица, трябва да се внимава да не се пръсле в очите.



4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Клинично значими взаимодействия между никотин-заместителната терапия и други лекарства не са категорично установени. Никотинът обаче може евентуално да засили хемодинамичните ефекти на аденоzin, т.е. повишаване на артериалното налягане и пулса, а също да увеличи отговора на болка (гръден болка тип ангина пекторис), провокирана от приложението на аденоzin, (виж точка 4.4. Прекратяване на пушенето).

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал/контрацепция при мъже и жени

Обратно на добре известните нежелани реакции при тютюневата зависимост върху зачеването и бременността, ефектите от терапевтичното лечение с никотин са неизвестни. Ето защо, макар че до момента не е намирано за необходимо да се предоставя конкретен съвет относно нуждата от контрацепция, най-разумно е жените, възnamерявщи да забременеят, да бъдат непушачи и да не използват НЗТ.

Въпреки че пушенето може да има неблагоприятни ефекти върху мъжкия фертилитет, не съществуват доказателства, че по време на лечение на мъже с НЗТ са необходими определени контрацептивни мерки.

Бременност

Пушенето по време на бременност е свързано с рискове, напр. вътрешаточно забавяне на растежа, преждевременно раждане или мъртво раждане. Прекратяването на пушенето е единствената най-ефективна интервенция за подобряване на здравето както на бременната пушачка, така и на нейното бебе. Колкото по-рано се постигне въздържането от пушене, толкова по-добре.

Никотинът преминава в плода и засяга дихателните му движения и кръвообращението. Ефектът върху кръвообращението зависи от дозата.

Поради това, бременната пушачка трябва винаги да се съветва да спре пушенето напълно без употребата на никотинова заместителна терапия. Рискът от продължаване на пушенето може да изложи плода на по-голям риск в сравнение с употребата на продукти, заместители на никотина, в рамките на наблюдавана програма за спиране на пушенето. Употреба на Никорет Фрешминт спрей за устна лигавица от бременни жени пушачки трябва да се започне само след съвет от медицински специалист.

Кърмене

Никотинът преминава лесно в кърмата в малки количества, които може да засегнат детето дори в терапевтични дози. Поради това, Никорет Фрешминт спрей за устна лигавица трябва да се избягва по време на кърмене. Ако не се постигне прекратяване на пушенето, употребата на Никорет Фрешминт спрей за устна лигавица от пушещи кърмачки трябва да се започне само след съвет от медицински специалист. Жените трябва да използват продукта непосредствено след кърмене и да направят пауза възможно най-дълго време (препоръчително 2 часа) между използването на спрея и следващото кърмене.

Фертилитет

Тютюнопушенето увеличава риска от безплодие при жените и мъжете. In-vitro изследвания показват, че никотинът може да се отрази неблагоприятно на качеството на човешките сперматозоиди. При пъхкове е показано нарушено качество на спермата и намаляване на фертилитета.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Никорет Фрешминт спрей за устна лигавица не повлиява или повлиява преместването на способността за шофиране и работа с машини.



4.8 Нежелани лекарствени реакции

Ефекти от спиране на тютюнопушенето

Независимо от използваните методи, известни са различни симптоми, които се свързват със спирането на привичното използване на тютюн. Тези симптоми включват емоционални или когнитивни ефекти, като дисфория или потиснато настроение; безсъние; раздразнителност, фрустрация или гняв; тревожност; затруднено концентриране и беспокойство или нетърпеливост. Също така може да се наблюдават физически ефекти, като бавен пулс; повишен апетит или увеличаване на тегло, замаяност или пресинкопални симптоми, кашлица, запек, кървене на венците или афтозни язви или назофарингит. В допълнение на това и с клинична значимост е, че силното желание за прием на никотин може да доведе до силни подтици за пушене.

Никорет Фрешминт спрей за устна лигавица може да предизвика нежелани реакции, подобни на тези, свързани с никотина, приложен по друг начин, като те са предимно дозо-зависими. Алергични реакции, напр. ангиоедем, уртикария или анафилаксия, може да възникнат при предразположени индивиди.

Локалните нежелани ефекти от приложението са подобни на тези, наблюдавани при други перорални форми. През първите няколко дни на лечение може да се получи дразнене на устата и гърлото, като хълцането е особено често. Обикновено, при продължителна употреба настъпва поносимост.

Ежедневното събиране на данни от участниците в клиничните изпитвания показва, че се съобщава за появата на много често възникващите нежелани събития през първите 2-3 седмици на употреба на спрея за устна лигавица, като те намаляват след това.

Нежеланите реакции на никотиновите препарати за устната лигавица, идентифицирани при клинични проучвания и по време на постмаркетинговия опит, са представени по-долу. Категорията за честотата е определена от клинични проучвания за нежеланите реакции, идентифицирани по време на постмаркетинговия опит.

Много чести ($\geq 1/10$); чести ($\geq 1/100$ до $< 1/10$); нечести ($\geq 1/1\,000$ до $< 1/100$); редки ($\geq 1/10\,000$ до $< 1/1\,000$); много редки ($< 1/10\,000$); с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Системо-органна класификация	Съобщена нежелана реакция
Нарушения на имунната система Чести С неизвестна честота	Свръхчувствителност Алергична реакция, включително ангиоедем и анафилактична реакция
Психични нарушения Нечести	Необичайни сънища
Нарушения на нервната система Много чести Чести	Главоболие Дисгеузия, парестезии
Очни нарушения С неизвестна честота	Замъглено зрение, засилено сълзоотделение
Сърдечни нарушения Нечести С неизвестна честота	Палпитации, тахикардия Предсърдно мъждене
Васкуларни нарушения Нечести	Зачервяване на кожата, хипертония
Респираторни, гръден и медиастинални нарушения	



Много чести Нечести	Хълцане, дразнене в гърлото Бронхоспазъм, ринорея, дисфония, диспнея, назална конгестия, орофарингеална болка, кихане, стягане в гърлото
Стомашно-чревни нарушения	
Много чести	Прилошаване
Чести	Коремна болка, сухота в устата, диария, диспепсия, флатуленция, хиперсаливация, стоматит, повръщане
Нечести	Оригване, кървене на венците, глосит, образуване на мехури и лющене на устната лигавица, орална парестезия
Редки	Дисфагия, орална хипостезия, гадене
С неизвестна честота	Сухота в гърлото, стомашно-чревен дискомфорт, болка в устните
Нарушения на кожата и подкожната тъкан	
Нечести	Хиперхидроза, сърбеж, обрив, уртикария
С неизвестна честота	Еритема
Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение	
Чести	Усещане за парене, умора
Нечести	Астения, дискомфорт в гръденния кош и болка, неразположение

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/рисък за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез националната система за съобщаване в:

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев“ № 8
1303 София
Тел.: +359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg

4.9 Предозиране

Когато продуктът се прилага според указанията, симптоми на предозиране с никотин може да възникнат при пациенти с нисък прием на никотин преди лечението или когато се използват едновременно други източници на никотин.

Симптомите на предозиране са симптоми на остро никотиново отравяне и включват гадене, повръщане, засилено слюноотделение, коремна болка, диария, изпотяване, главоболие, замайване, нарушен слух и подчертана слабост. При високи дози тези симптоми може да се последват от хипотония, slab и неритмичен пулс, затруднения в дишането, прострация, циркуляторен колапс и генерализирани гърчове.

Педиатрична популация

Дози никотин, които се понасят от възрастни пушачи по време на лечението, при дете може да предизвикат тежки симптоми на отравяне, които може да доведат до смърт. Подозирано никотиново отравяне при дете трябва да се счита за спешно състояние и да се лекува незабавно.



Лечение на предозирането: Приложението на никотин трябва да се спре незабавно и пациентите трябва да се лекуват симптоматично. Ако се погълне прекомерно количество, активираният въглен намалява стомашно-чревната резорбция на никотина.

Счита се, че острата минимална летална доза при перорално приложение на никотин при човека е 40 до 60 mg.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: лекарства, използвани при никотинова зависимост.

ATC код: N07B A01

Никотинът е агонист на никотиновите рецептори в периферната и централната нервна система и притежава изразено действие върху ЦНС и сърдечно-съдови реакции.

Внезапното прекратяване на доказана редовна употреба на продукти, съдържащи тютюн, води до характерен синдром със симптоми на отнемане, включително никотинов глад (желание за пушение). Клиничните изпитвания са показвали, че лечението с продукти, заместители на никотина, може да помогне на пушачите да се въздържат от пушение чрез повишаване на кръвните нива на никотина и облекчаване на тези симптоми на отнемане.

В сравнение с никотиновата дъвка или никотиновите таблетки за смучене резорбцията на никотина от спрея за устна лигавица е по-бърза (точка 5.2).

В едно открито, единодозово кръстосано клинично изпитване на никотиновия глад при 200 здрави пушачи се установява, че две впръсквания по 1 mg намаляват желанието да пушене значимо повече отколкото никотиновите таблетки за смучене 4 mg, като това започва 1 минута след приложението, и разлика между лекарствените форми е наблюдавана в продължение на 10 минути. Не е доказано, че свойствата на спрея водят до разлика по отношение на отказването от пушене.

5.2 Фармакокинетични свойства

Промените във формата на приемане оказват значими ефекти върху скоростта и степента на резорбция.

Фармакокинетиката на спрея за устна лигавица е изследвана в 4 клинични изпитвания. Клиничните изпитвания включват 141 лица.

Абсорбция

Максимална концентрация от 5,3 ng/mL е достигната 13 минути след приложение на доза от 2 mg. Като се сравнява AUC_{0-∞} през първите 10 минути след приложението, изчислено е, че спреят за устна лигавица в доза от 1 и 2 mg надвишава AUC на никотиновата дъвка, както и на никотиновите таблетки за смучене в дози от 4 mg (0,48 и 0,64 h*ng/mL срещу 0,33 и 0,33 h*ng/mL).

Изчисленията на AUC_{0-∞} показват, че бионаличността на никотина, приложен чрез спрей за устна лигавица, е подобна на тази на никотиновите дъвки или таблетките за смучене. AUC_{0-∞} на спрея за устна лигавица 2 mg достига 14,0 h*ng/mL в сравнение с 23,0 h*ng/mL и 26,7 h*ng/mL при никотиновите дъвки 4 mg и никотиновите таблетки за смучене 4 mg съответно.

Средните равновесни плазмени концентрации на никотин, достигнати след приложение на максималната доза (т.е. 2 впръсквания на спрея за устна лигавица 1 mg прес. 30 минути), са приблизително от порядъка на 28,8 ng/mL в сравнение с 23,3 ng/mL за никотиновите дъвки 4 mg (1 дъвка на час) и 25,5 ng/mL за никотиновите таблетки за смучене 4 mg (1 таблетка за смучене на час).



Разпределение

Обемът на разпределение след интравенозно приложение на никотин е около 2 до 3 l/kg.

Свързването на никотина с плазмените белтъци е под 5%. Поради това, не се очаква промените в свързването на никотина при едновременна употреба на лекарства или при промени на плазмените протеини поради болестни състояния да окажат значими ефекти върху фармакокинетиката на никотина.

Биотрансформация

Основният орган за елиминиране е черният дроб, въпреки че бъбреците и белите дробове също метаболизират никотина. Идентифицирани са повече от 20 метаболита на никотина, за всички от които се счита, че са по-слабо активни от изходното съединение.

Котинин, основният метаболит на никотина в плазмата, има полуживот от 15 до 20 часа и концентрации, които надхвърлят концентрациите на никотина 10 пъти.

Елиминиране

Средният плазмен клирънс на никотина е 70 l/час, а полуживотът е 2-3 часа.

Основните метаболити в урината са котинин (12% от дозата) и транс-3-хидрокси-котинин (37% от дозата). Около 10% от никотина се екскретират в непроменен вид в урината. До 30% от никотина може да се екскретира в непроменен вид в урината при висока честота на уриниране и подкиселяване на урината под pH 5.

Линейност/нелинейност

Наблюдавано е леко отклонение от линейността на дозата при AUC_∞ и C_{max}, когато се прилагат единократни дози от 1, 2, 3 и 4 впъръсквания по 1 mg спрей за устна лигавица.

Бъбречно увреждане

Прогресирането на тежестта на бъбречното увреждане е свързано с намаляване на общия клирънс на никотина. Никотиновият клирънс намалява средно с 50% при лица с тежко бъбречно увреждане. При пушачи на хемодиализа са наблюдавани повишени нива на никотин.

Чернодробно увреждане

Фармакокинетиката на никотина не се повлиява при болни с цироза с леко увреждане на черния дроб (5 точки по Child-Pugh) и е намалена с 40-50% при пациенти с умерено чернодробно увреждане (7 точки по Child-Pugh). Няма налична информация при лица с точки по Child-Pugh > 7.

Лица в старческа възраст

Малко намаление на общия клирънс на никотина, което не оправдава коригиране на дозата, е наблюдавано при здрави пациенти в старческа възраст.

5.3. Предклинични данни за безопасност

Никотинът дава предимно отрицателни резултати при някои тестове за генотоксичност *in vitro*. Получени са някои двусмислени резултати, когато са изследвани високи концентрации на никотин.

Изследванията на генотоксичността *in vivo* са отрицателни.

Изследванията при експериментални животни показват, че експозицията на никотин води до намалено тегло при раждане, намален брой новородени в котило и намалена преживяемост на потомството.

Резултатите от тестовете за карциногенност не показват категорични данни за гумодиспергентен ефект на никотина.



6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Пропиленгликол (E1520)
Безводен етанол
Трометамол
Полоксамер 407
Глицерол (E422)
Натриев хидроген карбонат
Левоментол
Ментов аромат
Охлаждащ аромат
Сукралоза
Ацесулфам калий
Бутилиран хидрокситолуен (E321)
Хлороводородна киселина (за pH регулиране)
Пречистена вода

6.2 Несъвместимости

Неприложимо.

6.3 Срок на годност

2 години.

6.4 Специални условия на съхранение

Да се съхранява под 30°C.

6.5 Вид и съдържание на опаковката

13,2 ml разтвор, напълнен в PET бутилка. Една бутилка съдържа 150 впръсквания по 1 mg. Бутилката е поставена в опаковка с дозиращо устройство с механична спрей помпа със задвижващ механизъм. Опаковката с дозиращото устройство е защитена за отваряне от деца.

Размер на опаковката:

1x1 опаковка с дозиращо устройство, 2x1 опаковки с дозиращо устройство

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

McNeil AB,
SE 251 09 Helsingborg,
Швеция



8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

20120479

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

26.09.2012

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Август 2018

