

Bloxivir

Гел спрей за уста

Bloxivir®БАРИЕРА
СРЕЩУ
ВИРУСИТЕ*

Блоксивир е медицинско изделие, предназначено за ежедневна защита срещу вирусни инфекции, както и за борба с активни вирусни инфекции. Може да се използва няколко пъти на ден, както за профилактика, така и за лечение при възрастни и деца над 1 година.

След прилагането му върху устната лигавица създава защитен слой, който представлява механична бариера за патогени, като съдържащите се в него вещества: йота-карагенан, натриев хиагуронат и ектоин, ги неутрализират. В резултат Блоксивир предпазва от силно инфекциозни вируси, облекчава симптомите на инфекцията и съкращава нейната продължителност. Поради това, той е метод както за предотвратяване, така и за борба срещу вирусни инфекции на горните дихателни пътища, причинени, наред с други, от грипни вируси и коронавируси, включително SARS-CoV-2. Използването на продукта от заразени (също така безсимптомни) лица намалява риска от заразяване на други.

Блоксивир е първият по рода си гел спрей за орална употреба, който предпазва, предотвратява и се бори с вирусното възпаление благодарение на три вещества, тествани в клинични изпитвания.

Съставки, отговорни за действието на продукта:

Йота-карагенан, натриев хиагуронат, ектоин

Помощни вещества: пропилен гликол, лимонена киселина, натриев хидроген фосфат, натриев фосфат, вода и консерванти.

Показания

1. ЗАЩИТА СРЕЩУ ПРОНИКВАНЕТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ВИРУСИ

- Блокира проникването на вируси в клетките и следователно предпазва от силно инфекциозни вирусни инфекции на горните дихателни пътища (грип и настинки, причинени от грипен вирус и коронавируси, както и от COVID-19, причинен от коронавируса SARS-CoV-2).
- Предпазва от разпространението на вируса (чрез ограничаване на предаването от симптоматични или асимптоматични хора към други).
- Предпазва от сухота и дразнене на лигавицата на устната кухина от фактори на околната среда.

Профилактично, за да се подпомогнат правилните физиологични функции на лигавицата на устната кухина.

2. ОБЛЕКЧАВАНЕ НА СИМПТОМИТЕ НА ИНФЕКЦИЯТА И ПОДКРЕПАЩО ЛЕЧЕНИЕ

- Блокира размножаването на вирусите и по този начин предотвратява появата на симптоми на заболяването.
- Облекчава симптомите на вирусни инфекции на горните дихателни пътища, включително фарингит (причинен от грипни вируси и коронавируси, включително SARS-CoV-2) и намалява сухотата в гърлото.
- Намалява непродуктивната суха кашлица - така наречената рефлекторна кашлица.
- Намалява болката в гърлото чрез овлажняващия си ефект.

3. СЪКРАЩАВАНЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО

- Намалява продължителността на заболяването, причинено от бактериални или вирусни инфекции на гърлото и сливиците.
- Намалява вероятността от развитие на бактериална суперинфекция, която често следва вирусната инфекция.

Механизъм на действие

Лигавицата на устата и гърлото представлява физическата защитна бариера на тялото. Всеки ден през гърлото преминават големи количества от различни вещества. То е входната врата на нашето тяло за хранителни вещества, но също така и за микроорганизми като грипни вируси и коронавируси, включително SARS-CoV-2. Специфичната структура на орофарингеалната лигавица, както и отделената слюнка предотвратяват проникването и разпространението на вируси, бактерии и гъбички.

Лигавицата на устата и гърлото представлява бариера и предпазва от бактерии и вируси, но само когато е в добро физиологично състояние. Увредената орофарингеална лигавица увеличава риска от остри и хронични инфекциозни заболявания.

Възрастните хора са особено уязвими към вирусни и бактериални инфекции, тъй като страдат от сухота в устата и гърлото, което често уврежда лигавицата на устната кухина. Това може да увеличи риска от остри и хронични инфекциозни заболявания, включително чести настинки и различни локални инфекции в устата и гърлото (причинени от различни видове вируси и коронавируси, включително SARS-CoV-2, който причинява COVID-19, и грипни вируси и коронавируси, които могат да причинят грип или настинки).

Можете обаче да се предпазите от инфекция чрез ежедневна профилактика. За тази цел е създадено медицинското изделие Блоксивир, което защитава, предотвратява и се бори с

вирусните инфекции благодарение на трите си активни съставки, чието действие е потвърдено в клинични изпитвания.

След разпръскването на продукта върху лигавиците на устата и гърлото се създава защитен слой, който поддържа естествената бариера на лигавицата и представлява механична бариера срещу проникването в тялото и размножаването на патогени. Този защитен ефект започва веднага след приложението на продукта.

Начин на употреба

Измийте ръцете си преди нанасяне. Преди първата употреба на спрея, след отстраняване на капачката, натиснете дозатора около 5 пъти последователно, докато се появи гел.

Поставете дозатора на входа на устата, като спазвате принципите на личната хигиена; натиснете дозатора, който ще разпръсне дозата на продукта в устната кухина. След нанасяне върху езика, приляскайте, за да улесните разпространението на продукта; този метод на употреба е особено показан за профилактика на вирусни инфекции.

Можете също така да поставите малко количество от хидрогела върху памучен тампон и внимателно да го приложите върху променените места на устната лигавица. Не изплаквайте устата, оставете продукта да действа за около 5-10 минути.

Препоръчителното количество е 1 до 2 дози (впръсквания), приложени върху езика в интервали от 4-5 часа между приложението.

Опаковката от 20 мл съдържа 200 дози от продукта.

Защитният ефект започва веднага след приложението на продукта.

Използвайте няколко пъти на ден както терапевтично, така и профилактично.

След като отстраните пулверизатора от бутилката, го измийте със сапунена вода, изплакнете го няколко пъти, изсушете го и го използвайте отново, след като го прикрепите към бутилката с продукта.

Продуктът е предназначен за възрастни и деца над 1 година.

В случай на симптоми на дискомфорт, прекратете употребата на продукта.

В случай на някакви притеснения се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт.

По хигиенни и епидемиологични причини една опаковка трябва да се използва само от един потребител.

Медицинско изделие, предназначено за използване в устната кухина само върху лигавицата на устата и гърлото - да не се яде.

Ако използвате по-висока от препоръчаната доза на медицинското изделие

По-високата доза от медицинското изделие не представлява заплаха.

При деца до 12-годишна възраст продуктът трябва да се използва под наблюдението на възрастен.

Следвайте препоръчания начин на употреба.

Противопоказания

- Не използвайте, ако сте алергични към съставките, съдържащи се в медицинското изделие.
- Не използвайте, ако се появят симптоми на сърбеж или парене след използване на продукта, което може да е индикация за алергия към съставките на медицинското изделие; в такъв случай **ПРЕКРАТЕТЕ УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТА**.
- Избягвайте случайния контакт на продукта с очната лигавица.
- Не използвайте заедно с други перорални препарати без консултация с лекар.
- Продуктът не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.
- Да не се използва след изтичане срока на годност.
- Не използвайте, ако опаковката е повредена.
- Не използвайте, ако опаковката е била повредена или подправена преди първото отваряне.
- Ако състоянието на устната лигавица се влоши, а симптомите на сухота и дразнене се задълбочат, консултирайте се с лекар специалист.
- Продуктът е предназначен за педиатрична употреба.
- При употреба от деца е необходимо наблюдение от родител / настойник.

Съдържание на опаковката

Опаковката на продукта съдържа бутилка с гел заедно с инструкции за употреба.

Наличен обем на продукта: 20 мл в стъклена бутилка.

Съхранение

Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка.

Съхранявайте при стайна температура 15-25 °C. Предпазвайте от източници на светлина и топлина.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте продукта, ако непосредствено опаковка е повредена.

Не използвайте след срока на годност, отбелязан върху опаковката.

* (грипни вируси и коронавируси)

МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ 

Производител:
LABORATOIRE L'IDEAL Parisien Sp. z o.o.
Aleje Zygmunta Krasińskiego 14/3a
30-101 Краков, Полша
тел. / факс +48 (12) 283 88 60

Дистрибутор:
Софарма Трейдинг АД,
ул. Лъчезар Станчев 5,
Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12,
гр. София 1756



Дата на актуализиране: 05.2021

Информация на опаковката