

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА

Листовка: информация за потребител

Визин Спринт 0,5 mg/ml капки за очи, течност

Visine Sprint 0.5 mg/ml eye drops, solution

тетризолинов хидрохлорид/tetrazyline hydrochloride 1 mg/ml 35230

Одобрение № 15 - 08 - 2021

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите никакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 2 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

**Какво съдържа тази листовка**

1. Какво представлява Визин Спринт и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Визин Спринт
3. Как да използвате Визин Спринт
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Визин Спринт
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

**1. Какво представлява Визин Спринт и за какво се използва**

Визин Спринт съдържа активното вещество тетризолинов хидрохлорид. Той принадлежи към група лекарства, наречени деконгестанти за офталмологично приложение (лекарство за приложение в окото).

Визин Спринт се използва за лечение на временно зачервяване на очите вследствие слабо неинфекциозно дразнене, дължащо се, например на пушек, прах, вятър, хлорирана вода, светлина, или алергии при възрастни, юноши, деца от 2-годишна възраст. Деца под 6 години трябва да се лекуват с Визин Спринт само след препоръка от медицински специалист.

**2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Визин Спринт**

**Не използвайте това лекарство:**

- ако сте алергични към тетризолинов хидрохлорид или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
- ако имате тесногълна глаукома
- при деца под 2 години.

**Предупреждения и предпазни мерки**

Говорете с Вашия лекар, преди да използвате Визин Спринт, ако страдате от следните заболявания. Може пак да можете да използвате Визин Спринт, но трябва първо да обсъдите с Вашия лекар, ако имате:

- сериозни сърдечносъдови заболявания (напр. исхемична болест на сърцето, високо кръвно налягане, феохромоцитом)
- доброкачествено увеличение на простатата



- метаболитни нарушения (напр. хипертиреоидизъм, диабет, нарушения на образуването на пигмент в червените кръвни клетки)
- сух ринит (хронично възпаление в предната част на носа)
- сух кератоконюнктивит (сухота на конюнктивата и роговицата)
- глаукома (заболяване на очите, при което се уврежда зрителният нерв, който свързва окото с мозъка)

Ако няма подобреие в рамките на 48 часа, ако зачерьяването или дразненето продължават или се влошават или ако получите промени в зрението или болка в очите, спрете употребата на това лекарство и се консултирайте с лекар. Дразненето или зачерьяването поради инфекция, чуждо тяло в окото или химическа травма на роговицата също налагат преглед от лекар. Ако получите главоболие, загуба на зрение, нарушения на зрението (напр. появя на плуващи обекти или двойно виждане), силно остро или еднострочно зачерьяване на очите, или болка при излагане на светлина, спрете употребата на лекарството и се консултирайте с лекар, тъй като това може да означава, че имате сериозно очно заболяване, за което този продукт няма да помогне.

Внимавайте да не използвате по-голямо от необходимото количество от това лекарство и да не го използвате твърде продължително (т.е. повече от 3-5 последователни дни), тъй като това може да влоши зачерьяването на очите или симптомите в носа.

Когато използвате този продукт, зениците Ви може временно да се разширят.

#### Указания за носителите на контактни лещи

По принцип, при наличие на очно заболяване не трябва да се носят контактни лещи. Ако се носят контактни лещи, те трябва да се махнат преди прилагане на лекарството и да не се поставят отново в продължение на 15 минути след прилагането.

#### **Деца**

Деца на възраст под 12 години трябва да накапват този лекарствен продукт само с помощта на възрастен.

#### *Деца над 2 и под 6 години*

Визин Спринт трябва да се използва само след препоръка от медицински специалист.

#### *Деца под 2-годишна възраст*

Да не се използва при деца под 2-годишна възраст.

#### **Други лекарства и Визин Спринт**

Преди да използвате това лекарство, трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, насъкоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства, особено други лекарства за очи.

Ако използвате антидепресанти, наречени инхибитори на моноамино оксидаза, или „трициклични антидепресанти“, трябва да избягвате да ги прилагате с Визин Спринт, тъй като това може да доведе до повишаване на кръвното налягане.

#### **Бременност, кърмене и фертилитет**

Липсват адекватни и добре контролирани проучвания на тетризолин при бременни и кърмещи жени. Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

#### **Шофиране и работа с машини**

След употреба на Визин Спринт може да настъпи разширение на зениците и размазано зрение. В такива случаи не трябва да шофирате и да работите с машини, докато не се възстанови зрението Ви.



## **Визин Спринт съдържа фосфати.**

Това лекарство съдържа 7,5 µg фосфати във всяка капка. Ако страдате от тежко увреждане на прозрачния слой на предната част на окото (роговицата), в много редки случаи фосфатите може да доведат до мътни петъница върху роговицата, дължащи се на натрупване на калций по време на лечението.

### **3. Как да използвате Визин Спринт**

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### **Деца на възраст 6 години и по-големи, юноши и възрастни:**

Освен ако лекар не е предписал нещо друго, накапвайте по 1 или 2 капки в засегнатото(ите)око(очи) 2 до 3 пъти на ден. Преди това махнете контактните лещи (вижте „Указания за носителите на контактни лещи“).

#### **Деца над 2 и под 6 години:**

При деца на възраст 2-6 години Визин Спринт трябва да се използва само след препоръка от медицински специалист.

#### **Деца под 2-годишна възраст**

Да не се използва при деца под 2-годишна възраст.

#### **Начин на приложение**

Визин Спринт е предназначен за приложение в окото.

1. Преди първото отваряне, махнете ръкавчето около шийката на бутилката, свидетелстващо за отваряне, като следвате перфорацията.
2. За да отворите защитената от деца капачка, натиснете я и я завъртете по посока обратна на часовниковата стрелка.
3. След отваряне на капачката, бутилката трябва да се обърне с дъното нагоре. Наклонете главата си леко назад. Леко стиснете бутилката, за да се накапе 1 или 2 капка(и) в конюнктивалната торбичка. Върхът на бутилката не трябва да влиза в контакт с нищо друго освен с капачката, за да се избегне замърсяване. Никога не докосвайте окото с върха на бутилката.
4. След прилагане, мигайте леко в продължение на няколко секунди, за да улесните равномерното разпределение на капките.
5. Затворете капачката, като я завъртите докрай по посока на часовниковата стрелка. Никога не докосвайте върха на бутилката. Между приложението бутилката трябва да се държи затворена.

#### **Продължителност на лечение**


Визин Спринт трябва да се използва за най-краткото време, необходимо за облекчаване на симптомите и не по-продължително от 5 последователни дни. Многократното прилагане трябва да се извършва внимателно, тъй като продължителната употреба (дори с кратки прекъсвания от няколко дни) или прекомерната употреба може да доведат до хронично отичане и/или атрофия на конюнктивата.

Продължителната употреба може да засили зачерьването на окото. Ако не се постигне облекчаване след 2 дни или ако зачерьването се влоши или продължава, преустановете употребата и се консултирайте с Вашия лекар.

#### **Ако сте използвали повече от необходимата доза Визин Спринт**

Когато се прилага в окото, няма вероятност от симптоми на предозиране. Случайно поенъпване обаче може да доведе до сериозни нежелани реакции или отравяне, особено при деца.

Тези сериозни нежелани реакции може да включват, без да се ограничават до сърдечно-съдови нестабилност, съниливост, кома, хипотермия (понижаване на телесната температура).



брадикардия (забавена сърдечна дейност), хипотония (ниско кръвно налягане) или хипертония (високо кръвно налягане), шокоподобно състояние, апнея, нарушения на кръвообращението, повръщане, лигавене и други системни реакции като напр. миза (прекомерно свиване на зеницата), летаргия (липса на енергия), сухота на лигавиците и нетипична болка в гърдите, засилено зачеряване на окото и носната лигавица.

При случайно поглъщане или при подозрение за случайно поглъщане от деца, консултирайте се незабавно с Вашия лекар или фармацевт или се обадете на 112.

**Ако сте пропуснали да използвате Визин Спринт**

Не използвайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

#### 4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Редки (може да засегнат до 1 на 1 000 души):

- ### - разширение на зениците

Много редки (може да засегнат до 1 на 10 000 души)

- сухота на конюнктивата със запушване на слъзните точки след продължителна употреба на тетризолин
  - сълзящо око след продължителна употреба на тетризолин.

Чести (може да засегнат до 1 на 10 души):

- Очно дразнене (болка, смъдене, парене)
  - Увредено зрение
  - Повтаряща се хиперемия
  - Парене на лигавиците
  - Сухи лигавици

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка):

- засилено сълзене
  - парене във или около очите, зачеряване, дразнене, отичане, болка, сърбеж

## **Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Тел.: +359 2 8903417

уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

## 5. Как да съхранявате Визин Спринт

Да се съхранява на място, недостъпно за лена.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелзан върху етикета и  
опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от срока на годност.

Да се съхранява под 30°C.



Изхвърлете продукта 6 седмици след разпечатване и отваряне на опаковката.  
Не използвайте това лекарство, ако забележите промяна на цвета или помътняване на разтвора.  
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.  
Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

### Какво съдържа Визин Спринт

- Активно вещество: 1 ml от капките за очи съдържа 0,5 mg тетризолинов хидрохлорид.
- Другите съставки са: глицерол, хипромелоза, макрогол 400, борна киселина, динатриев фосфат, натриев цитрат, калиев хлорид, магнезиев хлорид, натриев лактат, глицин, аскорбинова киселина, декстроза, поликватерниум 42, пречистена вода.

### Как изглежда Визин Спринт и какво съдържа опаковката

Визин Спринт е бистър, безцветен до бледожълт разтвор за очно приложение без видими частици.

Визин Спринт е наличен в 15 ml бутилка от LDPE с капкомер от LDPE и защитена от деца капачка от PP/HDPE.

### Притежател на разрешението за употреба

McNeil Healthcare (Ireland) Ltd.  
Airton Road, Tallaght  
Dublin 24  
Ирландия

### Производител

Janssen Pharmaceutica N.V.  
Turnhoutseweg 30  
2340 Beerse  
Белгия

Или

Johnson & Johnson GmbH  
Johnson & Johnson Platz 2  
41470 Neuss  
Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Джонсън & Джонсън България ЕООД  
ж.к. Младост 4,  
Бизнес Парк София, сграда 4  
София 1766  
Tel.: 02 489 94 00



**Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в държавите членки на ЕИП под следните имена:**

Германия	Visine Yxin Hydro
България	Визин Спринт
Хърватска	Visine
Кипър	Vispring Advance™
Чехия	Visine Rapid
Естония	Visine
Гърция	Vispring Advance™
Унгария	Visine Rapid
Латвия	Visine
Литва	Visine
Полша	Visine Comfort
Португалия	Visine
Румъния	Visine Novo
Словакия	Visine Rapid
Словения	VisiClear
Испания	Vispring

**Дата на последно преразглеждане на листовката: 04/2022 г.**

