

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка: информация за пациента	Листовка - Приложение 2
ФУНГИТЕР 1% крем FUNGITER 1% cream	Към Рев. № ..... <i>20210191</i>
Тербинафинов хидрохлорид Terbinafine hydrochloride	Разрешение № ..... <i>ББ/ЛСА/ЛР-55252</i>
	Одобрение № ..... <i>12.07.2021</i>

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 14 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

#### **Какво съдържа тази листовка**

1. Какво представлява ФУНГИТЕР 1% крем и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ФУНГИТЕР 1% крем
3. Как да използвате ФУНГИТЕР 1% крем
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ФУНГИТЕР 1% крем
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

#### **1. Какво представлява ФУНГИТЕР 1% крем и за какво се използва**

ФУНГИТЕР 1% крем е противогъбичен лекарствен продукт, който действа като убива гъбичките, причинители на кожни инфекции.

ФУНГИТЕР 1% крем се отпуска без лекарско предписание за лечение на следните кожни инфекции:


- гъбички между пръстите на краката и гъбички по стъпалото (*tinea pedis*);
- гъбички в ингвиналните области (*tinea cruris*);
- гъбички по тялото - трихофития (*tinea corporis*);
- кожна кандидоза - интертриго (*intertrigo*);
- разноцветен лишай ( *pityriasis versicolor*).

ФУНГИТЕР 1% крем се прилага и за лечение на кожни инфекции, предизвикани от дрожди.

#### **Как действа ФУНГИТЕР 1% крем**

##### **Как да разберете, че имате някои от посочените проблеми:**

- **Гъбички по краката:** най-често се появяват между пръстите, но може да бъдат и по иззвиката на ходилото, долната или друга част на стъпалата. Най-често срещаният тип гъбички по краката предизвиква напукване или лющене на кожата, но е възможно да имате и слаб оток, межури или мокри рани.
- **Гъбички в ингвиналните области:** появяват се където кожата може да бъде прегъната и да сърби, особено ако е влажна - това често са слабините и вътрешната част на бедрата.
- **Гъбички по тялото (трихофития):** може да се появят навсякъде по тялото, но най-често се откриват по главата, врата, лицето или ръцете. Обикновено изглеждат като кръгли петна червен обрив, но може да се появят като лющещи се петна и да сърбят.
- **Кожни кандидози (интертриго):** в прегънати участъци на тялото, където кожата е влажна от изпотяване (например под гърдите или подмишниците). Те обикновено се появяват при възрастни или пълни пациенти, или при такива, страдащи от други заболявания като диабет. Предизвикват засиряване, сърбеж, лющене.
- **Разноцветен лишай (*pityriasis versicolor*):** появява се по кожата като лющещи се петна, които стават бели, поради загубата на кожна пигментация. Петната са най-отчетливи предплътните.



тъй като кожата около тях потъмнява нормално. Появяват се главно по торса (под врата към талията), врата и ръцете и могат да се възобновяват в продължение на месеци, особено при топло време и потене.

*Ако не сте сигурни в причината за Вашата инфекция, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди употреба на ФУНГИТЕР 1% крем.*

## 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ФУНГИТЕР 1% крем

### Не използвайте ФУНГИТЕР 1% крем

- ако сте алергични към тербинафин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

### Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате ФУНГИТЕР 1% крем.

- ФУНГИТЕР 1% крем се прилага върху кожата;
- ФУНГИТЕР 1% крем е само за външна употреба;
- да не се използва в устата и да не се погълща;
- ФУНГИТЕР 1% крем може да предизвика дразнене на очите. В случаите на инцидентно попадане на ФУНГИТЕР 1% крем в очите, изплакнете ги старательно с течаща вода.

### Деца и юноши

Не се препоръчва използването на ФУНГИТЕР 1% крем при деца под 12 години.

### Други лекарства и ФУНГИТЕР 1% крем

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, насърко сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

### Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. ФУНГИТЕР 1% крем не трябва да се използва по време на бременност, освен при категорична необходимост. Не използвайте ФУНГИТЕР 1% крем докато кърмите. Не позволявайте бебетата да влизат в контакт с третираната кожа, включително гърдите. Лекарството може да премине в кърмата.

### Шофиране и работа с машини

ФУНГИТЕР 1% крем не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

ФУНГИТЕР 1% крем съдържа цетостеариолов алкохол, който може да причини локални реакции (напр. контактен дерматит).

ФУНГИТЕР 1% крем съдържа пропил паракидроксибензоат (E216) и метил паракидроксибензоат (E218), които могат да причинят алергични реакции (вероятно от забавен тип).

## 3. Как да използвате ФУНГИТЕР 1% крем

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

### Указания за употреба

- почистете и подсушете засегнатата кожа и прилежащите зони и измийте ръцете си;
- приложете достатъчно количество от крема за нанасяне на тънък слой върху засегнатата кожа и прилежащите зони;
- нежно втрийте;
- поставете капачката на тубата;



- измийте си ръцете, след като сте докосвали инфицираната кожа, за да не разпространите инфекцията върху себе си или други хора;
- ако третирате инфекция в зони, където кожата се прегъва, можете да покриете третираните участъци с марлена превръзка, особено през нощта. В такъв случай използвайте нова, чиста марля всеки път, когато прилагате крема.

**Колко често и колко продължително трябва да използвате ФУНГИТЕР 1% крем**  
ФУНГИТЕР 1% крем се използва 1-2 пъти на ден в продължение на 1-2 седмици.

Използвайте ФУНГИТЕР 1% крем в рамките на препоръчания период на лечение, дори да забелязвате подобреие по-рано. Облекчаването на клиничните симптоми обикновено настъпва след няколко дни, но инфекцията може да се повтори, ако ФУНГИТЕР 1% крем не се прилага редовно или употребата се прекрати търде рано.

При използването на ФУНГИТЕР 1% крем състоянието на кожата се подобрява след няколко дни. Но пълното възстановяване на засегнатата кожа, след като инфекцията е премахната, се постига за по-дълъг период - до 4 седмици. ФУНГИТЕР 1% крем ще продължи да действа, дори и след като сте приключили пълния курс на лечение. Въпреки че след това няма да използвате ФУНГИТЕР 1% крем, подобрението трябва да продължи.

Ако нямаете признания на подобреие след две седмици, трябва да се консултирате с лекар.

#### **Как да подпомогнете лечението**

За да подпомогнете лечението, поддържайте чиста засегнатата зона, като я миете редовно. Подсушавайте я внимателно, без да търкате, като попивате нежно. Постарайте се да не докосвате засегнатата зона, въпреки че може да Ви сърби, защото това може да предизвика допълнително усложнение и забавяне на оздравителния процес или разпространението на инфекцията.

Тъй като тези инфекции могат да бъдат предадени и на други хора, използвайте индивидуална кърпа и дрехи и не ги споделяйте с други. Редовно изпирайте дрехите и кърпите си, за да се предпазите от повторна инфекция.

#### **Ако сте пропуснали да използвате ФУНГИТЕР 1% крем**

Ако сте забравили да приложите ФУНГИТЕР 1% крем, приложете го веднага щом се сетите и след това продължете както обикновено. Не използвайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

#### **4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите реакции се класифицират по системо-органини класове и по честота по следния начин: много чести ( $\geq 1/10$ ), чести ( $\geq 1/100$  до  $< 1/10$ ), нечести ( $\geq 1/1\,000$  до  $< 1/100$ ), редки ( $\geq 1/10\,000$  до  $< 1/1\,000$ ), много редки ( $\leq 1/10\,000$ ), с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

*Чести* - лющене на кожата, сърбеж.

*Нечести* - кожни лезии, струпви, нарушение на кожата, промени в пигментацията, зачеряване, чувство за кожно парене, болка на мястото на прилагане, раздразнение на мястото на прилагане.

*Редки* - кожна сухота, екзема, контактен дерматит (тип възпаление на кожата).

#### **Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез



Изпълнителна агенция по лекарствата,  
ул. "Дамян Груев" № 8, 1303 София, България,  
тел.: +359 2 8903417,  
уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg).

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

## 5. Как да съхранявате ФУНГИТЕР 1% крем

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Съхранявайте тубата затворена в оригиналната опаковка.

Срок на годност след първото отваряне на тубата: 14 дни.

Да се съхранява под 25°C.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

### Какво съдържа ФУНГИТЕР 1% крем

- Активното вещество е тербинафинов хидрохлорид (terbinafine hydrochloride).
- Другите съставки са: пречистена вода, цетостеарилов алкохол, глицерол, пропил паракидроксибензоат (E216), метил паракидроксибензоат (E218), октилдодеканол, парафин течен.

Всяка опаковка съдържа една алуминиева туба с 15 g крем, заедно с листовка за пациента.

### Притежател на разрешението за употреба

Фортекс Нутрасютикалс ООД  
ул. Проходден кът № 10, София 1362  
България

### Производител

S.C. Hyperion S.A.  
169A Nicolina Street, Iasi  
Румъния

### Дата на последно преразглеждане на листовката

Май 2021

